PRACTICES	HYBRID MUSKMELON (DH. BAAG)	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಶ್ರೀಮಂತ)	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮುಖ (ಶ್ರೀಮಂತ)	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಶ್ರೀಮಂತ)	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಶ್ರೀಮಂತ)	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಶ್ರೀಮಂತ)	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಶ್ರೀಮಂತ)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ಹೊಲ ಶುಚಿ ಮಾಡುವುದು	ಬೂದಿ ಕೂಳೆ ನಿಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯದಾದ, ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಂದಿರುವಂತಹಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹೊಲದ ಹದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ.	ಗೊಬ್ಬರ ಚೆಲ್ಲುವುದು	ಇಳುವರಿ ಕಳಪೆ	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6-7.8. Avoid waterlogging, as muskmelon roots are shallow and sensitive to excess moisture.	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು.	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು	ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2–3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ	ಮಿಶ್ರಿತ ಕಳೆ, ಕೀಟಗಳು, ಮತ್ತಿತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ಹಾಗೂ ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕೀಟಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕೀಟಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು
Climate Suitability	Muskmelon is a warm season crop. Optimum temperature: 25–35 °C. Avoid frost and high humidity. Dry, hot weather improves fruit sweetness.	ಹವಾಮಾನ ಅನುಕೂಲ	ಹವಾಮಾನ ಕೂಳೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಾಪಮಾನ 25-35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಾಗೂ ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು
Land preparation	Deep ploughing 2–3 times followed by harrowing for fine tilth. Incorporate 8–10 ton FYM or compost per acre. Create ridge/raised beds for better drainage, especially in heavier soils.	ಭೂಮಿ ಹದಮಾಡುವುದು	ಮೆಂಡೆ ಹಾಕಿ ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು
Sowing Time	Spring-Summer Crop: Nov-Feb, Off-season: Sept-Oct	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ	ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು	ಸಸಿ ಕಿತ್ತುವುದು
Seed rate & Spacing	Seed rate: 350-400 grams (open field). Sowing: In ridges or raised beds, 1-2 cm deep. Pre-irrigate soil for better germination. Spacing: 2 m × 0.5-0.75 m	ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅಂತರ	ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Seed Treatment	Treat seeds with Carbendazim @ 2 gm/kg seed, can be followed by Trichoderma viride @ 4 gm/kg seed before sowing.	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು
Weed Management	Maintain weed-free field during first 3–4 weeks. Use shallow hoeing, intercultural operations, or mulching. Due to fine weedings may be required.	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
Fertilizer Management	FYM or Compost: 8-10 tons/Indian acre/ha. Chemical fertilizers: Urea -110 kg, SSP -155 kg, MOP -60 kg. Apply full P & K + 1/3 N at sowing, remaining N during vine growth and at fruit set. Foliar spray: 19:19:19 + micronutrients @ 2-3 g/L at 30-35 DAS; 0:0:50 + Boronanomix @ 2.5 ml/15 L at 55 DAS for better development and disease protection.	ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಳೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Irrigation Management	Uniform irrigation; avoid water stress and waterlogging. In summer: once a week or more in sandy soils. Reduce/stop irrigation 5–6 days before harvest to improve sweetness.	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು	ಕಳೆ ಕಸ ಕಿತ್ತುವುದು
Pest Management	Aphids & Thrips: Thiamethoxam @ 5 gm/15 L water. Leaf Miner: Abamectin @ 6 ml/15 L. Fruit Fly: Remove infested fruits. Neem seed kernel extract 50 gm/L water, repeat Malathion + Jaggery solution 3-4 times at 30 day intervals.	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ
Disease Management	Powdery Mildew: Water-soluble Sulphur 20 g/10 L, 2–3 sprays at 10-day intervals. Downy Mildew: Metalaxyl 8% + Mancozeb 64%, WP @ 2.5 g/L. Sudden Wilt: Avoid waterlogging. Trichoderma viride 1 kg + 50 kg FYM, spray systemic + contact fungicide when needed.	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
Harvesting & Yield	Half-slip stage (local market) or mature-green stage (long transport). Muskmelon gives average 14-15 ton fruits per acre.	ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ
Post-Harvest Management & Storage	Store the fruits in cool place after harvest. Grade by size and quality. Store and transport the fruits under recommended temperature.	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ
Disclaimer	These recommendations are based on SAU's, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	ಅಸ್ವೀಕಾರ	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಅಸ್ವೀಕಾರ	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಅಸ್ವೀಕಾರ	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಅಸ್ವೀಕಾರ	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಅಸ್ವೀಕಾರ	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಅಸ್ವೀಕಾರ	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಅಸ್ವೀಕಾರ	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಅಸ್ವೀಕಾರ