PRACTICES	HYLCUCUMBER (GREEN ZONE)	வகைகள்	முதிர்ச்சி வீச்சு (நாட்கள்)	வகைகள்	எண்ணிக்கை கிலோ (ஹெக்டேர்)	வகைகள்	முதிர்ச்சி வீச்சு (நாட்கள்)	நாற்றங்கால்	வளர்ச்சியின் முக்கியத்துவம் / விழிகள் தேவைகள்	வகைகள்	பயிர் இடைவெளி (நீளம் x அகலம்)	வகைகள்	பயிர்கள் சுழற்சி (மூன்று பிரிவு)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	**விதை வீரியம்**	குறைந்த வீரியம் கொண்ட நாற்றுகளை அகற்றி, ஆரோக்கியமான, ஒழுங்கான வேர் அமைப்புகளுடைய வீரியம் மிக்க நாற்றுகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கவும். வீரியம் குறைந்த நாற்றுகள் மகசூலை பாதிக்கலாம்.	**பீட்ரூட் மாவுப்பூச்சி**	வருவதற்கு 7-10 நாட்கள் முன்னால் வயலில் ஏதேனும் பயிர் எச்சங்கள், களைகள், பழைய கொடிகள் மற்றும் நோய் தாக்கப்பட்டதாவரப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை அகற்றவும். வயலை சுத்தமாக வைத்திருப்பது பூச்சி மற்றும் நோய் பரவுவதைக் குறைக்க உதவும்.	**பீட்ரூட் மாவுப்பூச்சி**	விதைப்பதற்கு முன்பு, முந்தைய பயிர்களின் எச்சங்கள், களைகள், பழைய கொடிகள் மற்றும் நோய் தாக்கப்பட்டதாவரப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை அகற்றவும். பூச்சி மற்றும் நோய் பரவுவதைக் குறைக்க, வயலின் வரப்புகளைச் சுத்தமாகவும் கவனமாகவும் பராமரிக்கவும்.	**பீட் வண்டுகள்**	பிஞ்சி வண்டுகள்	பிஞ்சி வண்டுகள் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் கவனிக்கவும். கவனமாக அகற்றவும். சேத அறிகுறிகளுக்காக தாவரங்களை கவனமாகக் கண்காணிக்கவும். சேதமடைந்த தாவரங்களை உடனடியாக அகற்றவும்.
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.0. Avoid waterlogging, as Cucumber is sensitive to excess moisture.	**சிறந்த வீச்சு**	வறண்ட மற்றும் மிதமான வெப்பநிலை நிலவும் பகுதிகளில் சிறந்த வீரியம் மற்றும் 6.0-7.0 அமிலத்தன்மை கொண்ட மண்ணில் வளரும் வகைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்.	**பருத்தி மாவுப்பூச்சி**	1 ஹெக்டேருக்கு 2-3 டன் மட்கிய எரு மற்றும் 2 கிலோ அசோஸ்பைரில்லம் மற்றும் 2 கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியா கலந்து விதைப்பதற்கு 30 நாட்கள் முன்னால் நாற்றங்கால் தயார் செய்யவும்.	**பருத்தி மாவுப்பூச்சி**	1 ஹெக்டேருக்கு 2 கிலோ அசோஸ்பைரில்லம் மற்றும் 2 கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியா கலந்து விதைப்பதற்கு 30 நாட்கள் முன்னால் நாற்றங்கால் தயார் செய்யவும்.	**பருத்தி மாவுப்பூச்சி**	மண்ணை கலப்பு வண்டல் மண் (முதல் வண்டல் மண் வகை), நல்ல வடிகால் வசதியுடன், வளமான, மற்றும் சிறந்த கரிமச்சத்துக்கள் கொண்ட மண் வகை. இது உகந்த pH அளவு சுமார் 6.0-7.0. வெள்ளரிக்காய் அதிகப்படியான ஈரப்பத்தத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடியது என்பதால், நீர் தேங்குவதைத் தவிர்க்கவும்.	**பிஞ்சு வண்டு**	மண்ணில் வசிப்பவை வண்டுகளாகி பிஞ்சு, பிஞ்சு பொரியும் பருவம் வரை, வளர்ந்து pH மண்ணை 6.0-7.0. மிகச்சரியான வகை கிடைக்கப்படாவிடில் மண்ணுக்கு ஏற்றவாறு சரிப்படுத்தவும். சேதமடைந்த தாவரங்களை உடனடியாக அகற்றவும்.
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	**மூல விதைகள்**	நிலைநிறுத்தப்பட்ட சத்துக்களின் ஆதிமொழிமுதல்களாக, குறைந்தபட்சம் 2-3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையாவது மண் பரிசோதனை செய்து, பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரமிடவும்.	**மண் பரிசோதனை**	EC, pH, OC மற்றும் மூலக்கூறு-மூலக்கூறு சோதனை செய்து, ஒவ்வொரு 2-3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையாவது மண் பரிசோதனை செய்து, பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரமிடவும்.	**மண் பரிசோதனை**	EC, pH, OC மற்றும் மூலக்கூறு-மூலக்கூறு சோதனை செய்து, ஒவ்வொரு 2-3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையாவது மண் பரிசோதனை செய்து, பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரமிடவும்.	**மண் பரிசோதனை**	EC, pH, OC மற்றும் மூலக்கூறு-மூலக்கூறு சோதனை செய்து, ஒவ்வொரு 2-3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையாவது மண் பரிசோதனை செய்து, பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரமிடவும்.
Climate Suitability	Climate / Weather Requirement: Temperature: Optimum 25 – 35 °C. Rainfall: 120-150 mm is suitable for the crop. Sowing temperature: 22-30 °C	**பருவநிலை நிலவரம்**	பருவநிலை / வானிலை தேவை: வெப்பநிலை: உகந்தது 25 – 35 °C. மழைப்பொழிவு: 120-150 மி.மீ. பயிருக்கு ஏற்றது. விதைப்பு வெப்பநிலை: 22-30 °C	**கலப்பினம் பொருத்தமுள்ள**	காலநிலை / வானிலை தேவை: வெப்பநிலை: அதிகபட்சம் 25 – 35 °C. மழைப்பொழிவு: 120-150 மி.மீ. உகந்தது. விதைப்பு வெப்பநிலை: 22-30 °C	**சாலையோர வைக்கோல்**	காலநிலை / வானிலை தேவை: வெப்பநிலை: அதிகபட்சம் 25 – 35 °C. மழைப்பொழிவு: 120-150 மி.மீ. வளர்வதற்கு. விதைப்பு வெப்பநிலை: 22-30 °C	**விவசாயம் வைக்கோல்**	காலநிலை / வானிலை தேவை: வெப்பநிலை: அதிகபட்சம் 25 – 35 °C. மழைப்பொழிவு: 120-150 மி.மீ. உகந்தது. விதைப்பு வெப்பநிலை: 22-30 °C
Land preparation	Land Preparation: Undertake 3-4 ploughings and harrowings to achieve fine tilth. Incorporate well-decomposed FYM (farmyard manure) when preparing the land.	**தரிசு நில சீரமைப்பு**	தரிசு நிலம் சீரமைப்பு: அமைப்பு மற்றும் நல்ல மகசூலுக்கு நிலத்தை 3-4 முறை உழவு மற்றும் மண்வெட்டி செய்யவும். நிலத்தை தயார் செய்யும் போது நன்கு மக்கிய கால்நடை எரு (FYM) ஐ சேர்க்கவும்.	**வாக்கிங் டோஸி**	நிலத்தை தயார் செய்யும் போது, நன்கு மக்கிய கால்நடை எரு (FYM) ஐ சேர்க்கவும்.	**நிலம் பதப்படுத்தல்**	நிலம் தயாரிப்பு: நல்ல பதுக்கத்தை அடைய 3-4 முறை உழவு மற்றும் மண்வெட்டி செய்யவும். நிலத்தை தயார் செய்யும் போது உரத்தை நன்கு மக்கிய கால்நடை எரு (FYM) கலக்கவும்.	**வாக்கிங் டோஸி**	தரிசு நிலம் சீரமைப்பு: நல்ல பதுக்கத்தை அடைய 3-4 முறை உழவு மற்றும் மண்வெட்டி செய்யவும். நிலத்தை தயார் செய்யும் போது உரத்தை நன்கு மக்கிய கால்நடை எரு (FYM) கலக்கவும்.
Sowing Time	Sowing Time / Season: Sowing is recommended in February-March for early crops. In low-tunnel or protected cultivation, December sowing may be used for early yield.	**மூலம் வா ஆகாய**	விதைப்பு காலம்/பருவம்: ஆரம்பி பயிர்கள் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் விதைப்பது சிறந்தது. குறைந்த உயரமுள்ள அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட சாகுபடியில், டிசம்பர் விதைப்பு ஆரம்பி பயிர்களுக்கு பயன்படலாம்.	**வெண்டி மாவு**	விதைப்பு / நேரம்: ஆரம்ப பிர்களுக்கு பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களில் விதைப்பது சிறந்தது. குறைந்த உயரமுள்ள அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட சாகுபடியில், டிசம்பர் விதைப்பு ஆரம்ப பயிர்களுக்கு பயன்படலாம்.	**விதைப்பு நேரம்**	விதைப்பு / நேரம்: ஆரம்ப பிர்களுக்கு பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களில் விதைப்பது சிறந்தது. குறைந்த உயரமுள்ள அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட சாகுபடியில், டிசம்பர் விதைப்பு ஆரம்ப பயிர்களுக்கு பயன்படலாம்.	**விதைப்பு நேரம்**	விதைப்பு / நேரம்: ஆரம்ப பிர்களுக்கு பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களில் விதைப்பது சிறந்தது. குறைந்த உயரமுள்ள அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட சாகுபடியில், டிசம்பர் விதைப்பு ஆரம்ப பயிர்களுக்கு பயன்படலாம்.
Seed rate & Spacing	Spacing / Seed Rate / Sowing Method: Spacing: Beds of width 2.5 m, seeds sown at 60 cm spacing between plants on beds. Seed rate: Approx. 1.0 kg per acre. Sowing depth: 2-3 cm.	**விதை வீரியம் குறி**	குறைந்த விதியிலிருக்க ரப்பருக்கு சிறிய 2.5 மீட்டர் பரப்பில் நாற்றுகளை, வரிசைகளில் விதைக்க விரும்பினால் ஒரு ஹெக்டேருக்கு சுமார் 1.0 கிலோ விதை தேவை. விதைப்பு ஆழம் 2-3 செ.மீ.	**விதைகள் வீரியம் பெற்ற**	விதை / விதைப்பு அளவு / விதைக்கும் முறை: விதை: 2.5 மீட்டர் பரப்பில் பகுதியாக பயன்படுத்தவும். விதைப்பு ஆழம் 2-3 செ.மீ.	**விதை விகிதம் மற்றும் இடைவெளி**	விதை / விதைப்பு / விதைக்கும் முறை: விதை: 2.5 மீட்டர் அகலமுள்ள பாத்தியில், வரிசைகளுக்கு இடைவெளி 60 செ.மீ இடைவெளியில் விதைகளை விதைக்கப்பட வேண்டும். விதைப்பு அளவு: ஏக்கருக்கு சுமார் 1.0 கிலோ.	**விதை விகிதம்**	விதை / விதைப்பு / விதைக்கும் முறை: விதை: 2.5 மீட்டர் அகலமுள்ள பாத்தியில், வரிசைகளுக்கு இடைவெளி 60 செ.மீ இடைவெளியில் விதைகளை விதைக்கப்பட வேண்டும். விதைப்பு ஆழம் 2-3 செ.மீ.
Seed Treatment	Seed Treatment: Treat seeds before sowing (e.g., with suitable chemical such as Captan @ 2 g per kg seed) to protect against seed-borne diseases.	**விதை சுத்தமாக**	விதை நேர்த்தி: விதைப்பதற்கு முன்பு விதைகளை (உ.ம., பொருத்தமான இரசாயனம் கேப்டன் 2 கி/கி விதை) சுத்திகரிக்கவும்.	**விதை சிகிச்சை**	விதை நேர்த்தி: விதைப்பதற்கு முன்பு விதைகளுக்கு நேர்த்தி செய்யவும் (உ.தா., கேப்டன் விதைக்கு 2 கி/கி).	**விதை நேர்த்தி**	விதை நேர்த்தி: விதைப்பதற்கு முன்பு விதைகளுக்கு நேர்த்தி செய்யவும் (உ.தா., கேப்டன் விதைக்கு 2 கி/கி).	**விதை நேர்த்தி**	விதை நேர்த்தி: விதைப்பதற்கு முன்பு விதைகளுக்கு நேர்த்தி செய்யவும் (உ.தா., கேப்டன் விதைக்கு 2 கி/கி).
Weed Management	Fertilizer / Nutrient Management: Basal dose per acre: Urea 99 kg, SSP 125 kg, MOP 35 kg (equivalent to N 40 kg, P 20 kg, K 20 kg). Application: At land preparation apply basal; at sowing apply one third of nitrogen + full P & K; remaining N at vine growth stage.	**வசதியான மகசூல்**	உரமிடல்/ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை: அடிப்படை அளவு ஏக்கருக்கு: யூரியா 99 கிலோ, எஸ்எஸ்பி 125 கிலோ, எம்ஓபி 35 கிலோ (N 40 கிலோ, P 20 கிலோ, K 20 கிலோ). பயன்பாடு: நிலத்தை தயார் செய்யும் போது அடிப்படை; விதைக்கும் போது நைட்ரஜனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு + முழு P & K; வளர்ச்சி நிலையில் மீதமுள்ள N.	**பீட்ரூட் வகைகளை**	களை மேலாண்மை: கையால் அல்லது இரசாயனம் கட்டுப்பாட்டு. விதைப்பதற்கு முன்பு/அல்லது இரசாயனம் கட்டுப்பாட்டு: 2,4-டி ஈதில்ஹெக்ஸில் 1.5 லி/ஹெக்டேர் (அகலமான இலை களைகளுக்கு). 1% கிளைபோசேட் மாற்று அல்லாமல் பயன்படுத்தக்கூடிய.	**ஒரு வகையான**	உரமிடல்/ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை: அடிப்படை அளவு ஏக்கருக்கு: யூரியா 99 கிலோ, எஸ்எஸ்பி 125 கிலோ, எம்ஓபி 35 கிலோ (N 40 கிலோ, P 20 கிலோ, K 20 கிலோ). பயன்பாடு: நிலத்தை தயார் செய்யும் போது அடிப்படை; விதைக்கும் போது நைட்ரஜனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு + முழு P & K; வளர்ச்சி நிலையில் மீதமுள்ள N.	**ஒரு வகையான**	உரமிடல்/ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை: அடிப்படை அளவு ஏக்கருக்கு: யூரியா 99 கிலோ, எஸ்எஸ்பி 125 கிலோ, எம்ஓபி 35 கிலோ (N 40 கிலோ, P 20 கிலோ, K 20 கிலோ). பயன்பாடு: நிலத்தை தயார் செய்யும் போது அடிப்படை; விதைக்கும் போது நைட்ரஜனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு + முழு P & K; வளர்ச்சி நிலையில் மீதமுள்ள N.
Fertilizer Management	Weed Control: Use manual hoeing and/or chemical control. Example: Glyphosate @ 1.6 litre per 150 litre water for non-crop weeds.	**அதிகமான மகசூல்**	அறுவடை மேலாண்மை: முதல் அறுவடை அரிய சமையல் பயன்பாடுகளுக்கு இளம்பருவ வெள்ளரிகளை அறுவடை செய்யவும். ஒரு ஹெக்டேருக்கு 1.6 லிட்டர் 150 லிட்டர் தண்ணீரில் களைமேலாண்மை.	**ஒரு வகையான**	மண் மேலாண்மை: தரமான மகசூலுக்கு அரிய சமையல் பயன்பாடுகளுக்கு இளம்பருவ வெள்ளரிகளை அறுவடை செய்யவும். ஒரு ஹெக்டேருக்கு 1.6 லிட்டர் 150 லிட்டர் தண்ணீரில் களைமேலாண்மை.	**உரமிடுதல்**	மண் மேலாண்மை: தரமான மகசூலுக்கு அரிய சமையல் பயன்பாடுகளுக்கு இளம்பருவ வெள்ளரிகளை அறுவடை செய்யவும். ஒரு ஹெக்டேருக்கு 1.6 லிட்டர் 150 லிட்டர் தண்ணீரில் களைமேலாண்மை.	**மண் மேலாண்மை**	மண் மேலாண்மை: தரமான மகசூலுக்கு அரிய சமையல் பயன்பாடுகளுக்கு இளம்பருவ வெள்ளரிகளை அறுவடை செய்யவும். ஒரு ஹெக்டேருக்கு 1.6 லிட்டர் 150 லிட்டர் தண்ணீரில் களைமேலாண்மை.
Irrigation Management	Irrigation: Frequent irrigation is required in summer, approx. 10-12 irrigations during the crop cycle. First irrigation pre-sowing, then every 2-3 days initially, later every 4-5 days. Drip irrigation is advantageous. Apni Khet	**சிறந்தவை**	நீர்ப்பாசனம்: கோடைகாலத்தில் அடிக்கடி நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படுகிறது; பயிர் சுழற்சி காலத்தில் சுமார் 10-12 முறை நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். முதல் நீர்ப்பாசனம் விதைப்பதற்கு முன்பு, பின்னர் ஆரம்பத்தில் 2-3 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும், பிறகு 4-5 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் செய்ய வேண்டும். சொட்டு நீர்ப்பாசனம் நன்மை பயக்கும். அப்னி கேத்தி	**நிலம் வகையான**	நீர்ப்பாசனம் மேலாண்மை: நிலத்தை தயார் செய்யும் போது, ஒரு ஹெக்டேருக்கு 1.6 லிட்டர் 150 லிட்டர் தண்ணீரில் களைமேலாண்மை.	**நீர்ப்பாசன மேலாண்மை**	நீர்ப்பாசனம் மேலாண்மை: நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படுகிறது; பயிர் சுழற்சி காலத்தில் சுமார் 10-12 முறை நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். முதல் நீர்ப்பாசனம் விதைப்பதற்கு முன்பு, பின்னர் ஆரம்பத்தில் 2-3 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும், பிறகு 4-5 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் செய்ய வேண்டும். சொட்டு நீர்ப்பாசனம் நன்மை பயக்கும். அப்னி கேத்தி	**அப்னி கேத்தி**	நீர்ப்பாசனம் மேலாண்மை: நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படுகிறது; பயிர் சுழற்சி காலத்தில் சுமார் 10-12 முறை நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். முதல் நீர்ப்பாசனம் விதைப்பதற்கு முன்பு, பின்னர் ஆரம்பத்தில் 2-3 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும், பிறகு 4-5 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் செய்ய வேண்டும். சொட்டு நீர்ப்பாசனம் நன்மை பயக்கும். அப்னி கேத்தி
Pest Management	Pest Management: Fruit flies, aphids common pests. Neem oil @3% commonly recommended, practice crop hygiene.	**வீரிய மகசூல்**	பூச்சி மேலாண்மை: பழ ஈக்கள், அஃபிட்களே பூச்சிகள் பொதுவானவை. பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக 3% வேப்ப எண்ணெயைப் பொதுவாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது; பயிர் கலாசாரத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும்.	**பூச்சி மேலாண்மை**	பூச்சி மேலாண்மை: பழ ஈக்கள், அஃபிட்களே பூச்சிகள் பொதுவானவை. பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக 3% வேப்ப எண்ணெயைப் பொதுவாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது; பயிர் கலாசாரத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும்.	**பூச்சி மேலாண்மை**	பூச்சி மேலாண்மை: பழ ஈக்கள், அஃபிட்களே பூச்சிகள் பொதுவானவை. பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக 3% வேப்ப எண்ணெயைப் பொதுவாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது; பயிர் கலாசாரத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும்.	**கை அல்லது**	பூச்சி மேலாண்மை: பழ ஈக்கள், அஃபிட்களே பூச்சிகள் பொதுவானவை. பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக 3% வேப்ப எண்ணெயைப் பொதுவாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது; பயிர் கலாசாரத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
Disease Management	Disease Management: Powdery mildew managed with fungicidal sprays (carbendazim etc.), mosaic and other foliar diseases controlled via appropriate sprays and sanitation.	**நல்ல விதை**	நோய் மேலாண்மை: சூரிய வெப்பத்தால் தூள்பூஞ்சை (கார்பென்டாசிம் வகை) தடை செய்யப்பட்டால் மற்றும் மொசைக் மற்றும் பிற இலை நோய்கள் பொருத்தமான தெளிப்பு மற்றும் சுகாதாரம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.	**நல்ல வகையான**	நோய் மேலாண்மை: சூரிய வெப்பத்தால் தூள்பூஞ்சை (கார்பென்டாசிம் வகை) தடை செய்யப்பட்டால் மற்றும் மொசைக் மற்றும் பிற இலை நோய்கள் பொருத்தமான தெளிப்பு மற்றும் சுகாதாரம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.	**நோய் மேலாண்மை**	நோய் மேலாண்மை: சூரிய வெப்பத்தால் தூள்பூஞ்சை (கார்பென்டாசிம் வகை) தடை செய்யப்பட்டால் மற்றும் மொசைக் மற்றும் பிற இலை நோய்கள் பொருத்தமான தெளிப்பு மற்றும் சுகாதாரம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.	**நோய் மேலாண்மை**	நோய் மேலாண்மை: சூரிய வெப்பத்தால் தூள்பூஞ்சை (கார்பென்டாசிம் வகை) தடை செய்யப்பட்டால் மற்றும் மொசைக் மற்றும் பிற இலை நோய்கள் பொருத்தமான தெளிப்பு மற்றும் சுகாதாரம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.
Harvesting & Yield	Harvesting / Yield: The crop starts yielding about 45-50 days after sowing. Apni Khet Typically 10-12 pickings are done. Yield: ~33-42 q/Acre.	**வரம் தரும் நாள்**	அறுவடை/மகசூல்: பயிர் விதைத்த சுமார் 45-50 நாட்கள் கழித்து மகசூல் தரத் தொடங்கும். அப்னி கேத்தி: அறுவடை பொதுவாக 10-12 முறை நடக்கும். மகசூல்: ~33-42 குவிண்டால்/ஏக்கர்.	**வரலாறு தரும் நாள்**	அறுவடை/மகசூல்: பயிர் விதைத்த சுமார் 45-50 நாட்கள் கழித்து மகசூல் தரத் தொடங்கும். அப்னி கேத்தி: அறுவடை பொதுவாக 10-12 முறை நடக்கும். மகசூல்: ~33-42 குவிண்டால்/ஏக்கர்.	**அறுவடை மற்றும் மகசூல்**	அறுவடை/மகசூல்: பயிர் விதைத்த சுமார் 45-50 நாட்கள் கழித்து மகசூல் தரத் தொடங்கும். அப்னி கேத்தி: அறுவடை பொதுவாக 10-12 முறை நடக்கும். மகசூல்: ~33-42 குவிண்டால்/ஏக்கர்.	**Yield: ~ 6 ton/ha**	அறுவடை/மகசூல்: பயிர் விதைத்த சுமார் 45-50 நாட்கள் கழித்து மகசூல் தரத் தொடங்கும். அப்னி கேத்தி: அறுவடை பொதுவாக 10-12 முறை நடக்கும். மகசூல்: ~33-42 குவிண்டால்/ஏக்கர்.
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest & Handling: Harvest fruits when young & green, using sharp tool to avoid damage. Handle carefully, sort/grading for market. (Note: detailed post-harvest handling may need to be adapted locally.)	**வரலாறு தரும் நாள் மற்றும் அறுவடை விதைகள்**	அறுவடை மற்றும் கையாளுதல்: காயம் ஏற்படாமல் தவிர்க்க கூர்மையான கருவியைப் பயன்படுத்தி, அவை இளமையாகவும் பச்சையாகவும் இருக்கும்போதே அறுவடை செய்யவும். கவனமாகக் கையாளவும், சந்தைக்காகத் தரம் பிரிக்கவும். (குறிப்பு: அறுவடைக்குப் பிந்தைய விரிவான கையாளுதல் மாற்றியமைக்கப்பட்டு தேவைப்படலாம்.)	**வரலாறு தரும் நாள் மற்றும் விதைகள்**	அறுவடை மற்றும் கையாளுதல்: காயம் ஏற்படாமல் தவிர்க்க கூர்மையான கருவியைப் பயன்படுத்தி, அவை இளமையாகவும் பச்சையாகவும் இருக்கும்போதே அறுவடை செய்யவும். கவனமாகக் கையாளவும், சந்தைக்காகத் தரம் பிரிக்கவும். (குறிப்பு: அறுவடைக்குப் பிந்தைய விரிவான கையாளுதல் மாற்றியமைக்கப்பட்டு தேவைப்படலாம்.)	**வரலாறு தரும் நாள் மற்றும் விதைகள்**	அறுவடை மற்றும் கையாளுதல்: காயம் ஏற்படாமல் தவிர்க்க கூர்மையான கருவியைப் பயன்படுத்தி, அவை இளமையாகவும் பச்சையாகவும் இருக்கும்போதே அறுவடை செய்யவும். கவனமாகக் கையாளவும், சந்தைக்காகத் தரம் பிரிக்கவும். (குறிப்பு: அறுவடைக்குப் பிந்தைய விரிவான கையாளுதல் மாற்றியமைக்கப்பட்டு தேவைப்படலாம்.)	**வரலாறு தரும் நாள் மற்றும் விதைகள்**	அறுவடை மற்றும் கையாளுதல்: காயம் ஏற்படாமல் தவிர்க்க கூர்மையான கருவியைப் பயன்படுத்தி, அவை இளமையாகவும் பச்சையாகவும் இருக்கும்போதே அறுவடை செய்யவும். கவனமாகக் கையாளவும், சந்தைக்காகத் தரம் பிரிக்கவும். (குறிப்பு: அறுவடைக்குப் பிந்தைய விரிவான கையாளுதல் மாற்றியமைக்கப்பட்டு தேவைப்படலாம்.)
Disclaimer	These recommendations are based on SAU's, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	**நல்லவை**	இவை பல்கலைக்கழகம், அரசாங்க ஏஜென்சிகள் மற்றும் சோதனை மையங்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. உண்மையான முடிவுகள் மண் வகை, காலநிலை, பயிர் இனம் மற்றும் பயிர் மேலாண்மை நடைமுறைகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.	**பயிர்**	இந்திய பரிந்துரைகள் சிறப்புப் பயன்பாட்டு துவக்கங்கள் (SAU-கள்), அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் சோதனை மையங்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. உண்மையான முடிவுகள் மண் வகை, காலநிலை, பயிர் இனம் மற்றும் பயிர் மேலாண்மை நடைமுறைகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.	**Disclaimer**	ஈ பேரிபாப்பாய் SAU-வுக், மாநாடு ஏஜென்சிகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சோதனைகளுக்கு ஆதரவாகவே. உண்மையான விளைவுகள் மண் வகை, காலநிலை, பயிர் இனம் மற்றும் பயிர் மேலாண்மை நடைமுறைகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.	**விக்ஷாஸ்!**