English	HYBRID CHILLI (HITLER-243)	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ (ગુજરાતી 243)	ગુજરાતી	ગુજરાતિ લિપિ (ગુજરાતી 243)	தமிழ்.தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ (ગુજરાતી 243)	ગુજરાતિ લિપિ (ગુજરાતી 243)	ગુજરાતિ (ગુજરાતી 243)	ગુજરાતિ લિપિ (ગુજરાતી 243)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old cows and diseased damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ગુજરાતી ના જૂના પાકના અવશેષો અને નકામાં ઢોર અને રોગગ્રસ્તક્ષતિગ્રસ્ત વૉર્મી ની ફરતે વાવણી પહેલાં દૂર કરો. જીવાત અને રોગના ફેલાવાને ઘટાડવા માટે ખેતરની સીમાઓ સ્વચ્છ રાખો.	ગુજરાતી લિપિ	ગુજરાતી વોર્મી પાકના અવશેષો, નકામાં ઢોર અને રોગગ્રસ્તક્ષતિગ્રસ્ત વૉર્મી સામગ્રી દૂર કરો. જીવાત અને રોગના ફેલાવાને ઘટાડવા માટે ખેતરની સીમાઓ સ્વચ્છ રાખો.	ગુજરાતી	தமிழ்	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter, Ideal pH range: around 6.0-7.0. Avoid waterlogging, as Chilli is sensitive to excess moisture.	ગુજરાતી લોમ તે લોમ મિટ્ટી, સારી રીતે નિકાલી કરેલી, ફળદ્રુપ અને સારાં સેન્દ્રિય પદાર્થ યુક્ત; આદર્શ પીએચ શ્રેણી: આશરે 6.0-7.0. પાણી ભરાવાનું ટાળો, કારણ કે મરચાં વધુ પડતા ભેજ પ્રતિ સંવેદનશીલ છોડ છે.	ગુજરાતી પ્રાઈવેટ	કેળાને લોમ્સની લોમ જમીન, સારા પાણીના નિકાલવાળી, ફળદ્રુપ, સારા સાર્વિક પદાર્થોવાળી. આદર્શ pH શ્રેણી: આશરે 6.0-7.0. પાણી ભરાવાનું ટાળો, કારણ કે મરચાં વધુ પડતા ભેજ પ્રતિ સંવેદનશીલ છોડ છે.	ગુજરાતી	மண் தேவை	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on soil results.	ગુજરાતિ ઓ ઓછામાં ઓછા એક વાર દર 2-3 વર્ષે એક વાર માટી પરીક્ષણ કરો અને માટી પરીક્ષણના પરિણામોના આધારે ખાતર લાગુ કરો.	ગુજરાતી પરીક્ષણ	EC, pH, OC અને મેક્રો-માઈક્રો પોષક તત્વો માટે ઓછામાં ઓછા દર 2-3 વર્ષે એક વાર માટી પરીક્ષણ કરો અને પરીક્ષણના પરિણામોના આધારે ખાતર લાગુ કરો.	ગુજરાતી	மண் பரிசோதனை	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Climate Suitability	Climate Requirement Water-season crop. Temperature: 25–30 °C. Does not tolerate frost or high humidity. Annual rainfall: 625–1500 mm is ideal if well-distributed.	અનાજનું સાપેક્ષ તાપમાન વરસાદ ઋતુનો પાક. તાપમાન: 25–30 °C. હિમ કે ઉચ્ચ ભેજ સહન કરતું નથી. વાર્ષિક વરસાદ: 625–1500 મિમી, જો સારી રીતે વિતરિત હશે, તો આદર્શ છે.	અનાજનાનો અનાજનાનો વરસાદ ઋતુનો પાક. તાપમાન: 25-30 °C હિમ કે ઉચ્ચ ભેજ સહન કરતું નથી. વાર્ષિક વરસાદ: 625-1500 મિમી જો સારી રીતે વિતરિત હશે તો આદર્શ છે.	વરસાદ ઋતુનાં	વરસાદ ઋતુનાં	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Land preparation	Land Preparation 2–3 deep ploughings followed by harrowing to make fine tilth. Add 20-25 t/ha FYM (farmyard manure) during last ploughing. Raised beds or ridges recommended in heavy soil areas for proper drainage	મૂળિયાં તૈયારી 2-3 ઊંડા ખેડાણ કરો અને ઝીણા ટિલ્થ બનાવવા માટે હેરોઈંગ કરો. અંતિમ ખેડાણ દરમ્યાન 20-25 ટન પ્રતિ હેક્ટર ગોબર ખાતર (એફવાયએમ) ઉમેરો. યોગ્ય ડ્રેનેજ માટે ભારે જમીન વાળા વિસ્તારોમાં ઉભેલા બેડ અથવા રીજની ભલામણ કરવામાં આવે છે.	મૂળિયાં તૈયારી	2-3 ઊંડા ખેડાણ કરો અને ઝીણા ટિલ્થ બનાવવા માટે હેરોઈંગ કરો. અંતિમ ખેડાણ દરમ્યાન 20-25 ટન પ્રતિ હેક્ટર ગોબર ખાતર (એફવાયએમ) ઉમેરો. યોગ્ય ડ્રેનેજ માટે ભારે જમીન વાળા વિસ્તારોમાં ઉભેલા બેડ અથવા રીજની ભલામણ કરવામાં આવે છે.	મૂળિયાં તૈયારી	મૂળિયાં તૈયારી	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Sowing Time	Sowing Time / Season • Nursery sowing: January–February (for summer crop) and June–July (for Kharif). • Seeds Indoor. Throughout the year depending on irrigation. Transplanting after 30–40 days when seedlings are 12–15 cm tall. (Source: Kerala Agriculture Dept & Vikaspedia)	ગુજરાતી ના વાવણીનાં સમય • નર્સરી વાવણી: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી (ઉનાળાના પાક માટે) અને જૂન-જુલાઈ (ખરીફ પાક માટે). • બીજ ઇન્ડોર. સિંચાઈ પર આધાર રાખીને આખું વર્ષ. રોપણ 30-40 દિવસ પછી કરવામાં આવે છે જ્યારે રોપાઓ 12-15 સેમી ઊંચા હોય. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ વિભાગ અને વિકાસપેડિયા)	વાવણીનો સમય / માહ • નિંદર સરાય: નર્સરી વાવણી જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી (ઉનાળાના પાક માટે) અને જૂન-જુલાઈ (ખરીફ પાક માટે). • ઇન્ડોર સરાય: બિયારણ ઇન્ડોર સરાય છે. રોપણ 30-40 દિવસ પછી કરવામાં આવે છે જ્યારે રોપાઓ 12-15 સેમી ઊંચા હોય. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ વિભાગ અને વિકાસપેડિયા)	વાવણીનો સમય	વાવણીનો સમય	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Seed rate & Spacing	Seed Rate / Sowing Method / Spacing Seed rate: 400 grams/ipm (pollinated) or 100 g/acre (hybrid). Sow in nursery beds (10 m × 1 m × 15 cm height), cover with shade net. Irrigate lightly until germination. Spacing: 60 × 60 cm for irrigated crops; 75 × 60 cm in rainfed conditions. (Source: Kerala Agriculture Dept.)	બિયારણ દર / વાવણી પદ્ધતિ / અંતર બિયારણ દર: 400 ગ્રામ/એકર (પ્રજનન પરાગરજ) અથવા 100 ગ્રામ/એકર (સંકર). વાવણી: નર્સરી પથારી (1 મીટર પહોળાઈ, 15 સે.મી. ઊંચાઈ) પર વાવો, છાયાની જાળીથી ઢાંકી દો. અંકુરણ થાય ત્યાં સુધી હળવેથી સિંચાઈ કરો. અંતર: સિંચાઈવાળા પાક માટે 60 × 60 સે.મી.; વરસાદી પરિસ્થિતિમાં 75 × 60 સે.મી. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ વિભાગ)	બિયારણ દર / વાવણી પદ્ધતિ / અંતર બિયારણ દર: 400 ગ્રામ/એકર (પ્રજનન પરાગરજ) અથવા 100 ગ્રામ/એકર (સંકર). વાવણી: નર્સરી પથારી (1 મીટર પહોળાઈ, 15 સે.મી. ઊંચાઈ) પર વાવો, છાયાની જાળીથી ઢાંકી દો. અંકુરણ થાય ત્યાં સુધી હળવેથી સિંચાઈ કરો. અંતર: સિંચાઈવાળા પાક માટે 60 × 60 સે.મી.; વરસાદી પરિસ્થિતિમાં 75 × 60 સે.મી. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ વિભાગ)	બિયારણ દર	બિયારણ દર અને અંતર	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Seed Treatment	Seed Treatment Treat seeds with Trichoderma viride @ 4 g/kg seed or Pseudomonas fluorescens @ 10 g/kg before sowing to prevent fungal diseases. For chemical treatment: Captan or Thiram @ 2 g/kg seed.	બીજ સારવાર બધાજી બીજની સારવાર કરો ટ્રાઈકોડર્મા વિરીડે (4 ગ્રામ/કિલો બીજ) અથવા સ્યુડોમોનાસ ફ્લોરોસેન્સ (10 ગ્રામ/કિલો બીજ) વાવણી પહેલાં ફંગલ રોગોને રોકવા માટે. રાસાયણિક સારવાર: કેપ્ટન અથવા થિરામ @ 2 ગ્રામ/કિલો બીજ.	બીજ સારવાર ટ્રાઈકોડર્મા વિરીડે અથવા સ્યુડોમોનાસ ફ્લોરોસેન્સ (10 ગ્રામ/કિલો બીજ) વાવણી પહેલાં ફંગલ રોગોને રોકવા માટે. રાસાયણિક સારવાર: કેપ્ટન અથવા થિરામ @ 2 ગ્રામ/કિલો બીજ.	બીજ સારવાર	બીજ સારવાર	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Weed Management	Weed Control First hand weeding at 25–30 days after transplanting and second after 50–55 days. Mulching with plastic or organic residues helps control weeds and conserve moisture. Avoid deep hoeing near roots.	આગાહાના કંટ્રોલ રોપણ કે 25-30 દિવસ બાદ પહેલી વાર અને 50-55 દિવસ બાદ બીજી વાર સાગવાડી કરો તથા તે જોવાડો. પ્લાસ્ટિક અથવા કૃષિ અવશેષો તે તાપમાનને અને નીંદણને નિયંત્રણ કરવામાં મદદ કરે છે. મૂળ નજીક ઊંડા ખોદકામ ટાળો.	આગાહાના કંટ્રોલ પહેલી વાર સાગવાડી કરો તથા તે જોવાડો. પ્લાસ્ટિક અથવા કૃષિ અવશેષો તે તાપમાનને અને નીંદણને નિયંત્રણ કરવામાં મદદ કરે છે. મૂળ નજીક ઊંડા ખોદકામ ટાળો.	નીંદણ વ્યવસ્થાપન	નીંદણ વ્યવસ્થાપન	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Fertilizer Management	Fertilizer & Nutrient Management Apply fertilizers based on soil test; general guideline per hectare: • FYM: 20–25 t (basal) • NPK: 160:100:100 kg/ha (N:P:K:K2O) Application schedule: - Full P & K and half N as basal dose before transplanting. - Remaining N in two equal splits — at 30 and 60 days after transplanting. Use Azospirillum and Phosphobacteria (2 kg/ha along with organic manure. (Source: Kerala Agriculture & Vikaspedia)	ઝાંખરા ના ખાતર અને વ્યવસ્થા સૂક્ષ્મ પોષકતત્વ કે ઝાંખરા પર આધાર રાખીને જ્યારે ઝાંખરા પરિક્ષણ કરવામાં આવે ત્યારે: • ગોબર ની ખાદ: 20-25 ટન (આધારભૂત) • એનપીકે: 160:100:100 કિગ્રા/હેક્ટર (એન:પી:કે:કે2ઓ) અરજીના સમય: - રોપણી પહેલાં સંપૂર્ણ ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ અને અડધો નાઈટ્રોજન મૂળભૂત આપવું. - રોપણી પછી 30 અને 60 દિવસે બે સમાન ભાગોમાં બાકી રહેલા નાઈટ્રોજન. આઝોસ્પિરિલમ અને ફોસ્ફોબેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ કરો (સેન્દ્રિય ખાતરમાં 2 કિલોગ્રામ/હેક્ટર ઉમેરીને કરો. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ અને વિકાસપેડિયા)	ખાતર અને પોષક તત્વોનું સંચાલન માટી પરીક્ષણના આધાર પર ખાતર આપો; પ્રતિ હેક્ટર સામાન્ય માર્ગદર્શિકા: - એફવાયએમ: 20-25 ટન (બેઝલ) - એનપીકે: 160:100:100 કિગ્રા/હેક્ટર (એન:પી:કે:કે2ઓ) અરજી શેડ્યૂલ: - રોપણી પહેલાં સંપૂર્ણ ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ અને અડધો નાઈટ્રોજન મૂળભૂત આપવું. - બાકીનો નાઈટ્રોજન બે સમાન ભાગમાં — રોપણી પછી 30 અને 60 દિવસે. એઝોસ્પિરિલમ અને ફોસ્ફોબેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ કરો (સેન્દ્રિય ખાતર સાથે 2 કિલોગ્રામ/હેક્ટર. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ અને વિકાસપેડિયા)	ખાતર વ્યવસ્થાપન	ખાતર વ્યવસ્થાપન	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Irrigation Management	Irrigation Management Maintain uniform soil moisture; avoid water stress and waterlogging. • Immediately after transplanting: light irrigation. • Vegetative to flowering stage: irrigation every 5-6 days in light soils and 7-10 days in heavy soils. • Reduce frequency of irrigation during flowering and fruit maturity to prevent fruit rot. Drip irrigation improves yield and water efficiency. (Source: KSHEM Karnataka & Kerala Agriculture)	સિંચાઈ મેનેજમેન્ટ સિંચાઈ એ તમામ પાક સમાન સ્થાન રાખી, પાણી તાણ અને પાણી ભરાવાનું ટાળો. • રોપણી પછી તુરત જ: હળવી સિંચાઈ; • વનસ્પતિમાં ફૂલ સુધી: હળવી જમીનમાં દર 5-6 દિવસે અને ભારે જમીનમાં દર 7-10 દિવસે સિંચાઈ; • ફૂલમાં અને ફળ પરિપક્વતા: સિંચાઈ ઓછી કરો જેથી ફળ સડો ન થાય. ટિપ સિંચાઈ તે ઉપજ અને કાર્યક્ષમતા સુધારે છે. (સ્રોત: કેએસએચઈ કર્ણાટક અને કેરળ કૃષિ)	સિંચાઈ વ્યવસ્થાપન જમીનમાં સમાન ભેજ જાળવો; પાણીની તાણ અને પાણી ભરાવાનું ટાળો. • રોપણી પછી તરત જ: હળવી સિંચાઈ. • વનસ્પતિથી ફૂલ સુધીના તબક્કો: હળવી જમીનમાં દર 5-6 દિવસે અને ભારે જમીનમાં દર 7-10 દિવસે સિંચાઈ. • ફળ અને ફળ પરિપક્વતા: સિંચાઈ ઓછી કરો જેથી ફળ સડો ન થાય. ટપક સિંચાઈ ઉપજ અને પાણીની કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરે છે. (સ્રોત: કેએસએચઈ કર્ણાટક અને કેરળ કૃષિ)	સિંચાઈ વ્યવસ્થાપન	સિંચાઈ વ્યવસ્થાપન	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Pest Management	Pest Management 1. Fruit borer (Helicoverpa armigera): Spray Emamectin Benzoate 5% WG @ 0.4 g/L or Spinosad 45% SC @ 0.3 ml/L 2. Thrips & Mites: Use Blue Sticky Traps @ 5/acre, spray Fipronil 5% SC @ 1 ml/L or Imidacloprid 17.8% SL @ 0.5 ml/L. 3. Aphids: Use Yellow Sticky Traps, spray Acetamiprid 20% SP @ 0.5 g/10 L water or Neem oil @ 5%. (Source: Agri Khet & ICAR)	પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 1. ફળ છેદક (હેલિકોવરપા આર્મિગેરા): ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5% ડબ્લ્યુજી @ 0.4 ગ્રામ/લિટર અથવા સ્પિનોસાડ 45% એસસી @ 0.3 મિલીલીટર પ્રતિ લિટરના દરે સ્પ્રે કરો. 2. થ્રિપ્સ અને સ્પાઈડર: વાદળી ચિકણી જાળ @ દીઠ એકર આકર્ષક કરો, ફિપ્રોનિલ 5% એસસી @ 1 મિલીલીટર પ્રતિ લિટરનો સ્પ્રે કરો અથવા ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% એસએલ @ 0.5 મિલીલીટર પ્રતિ લિટરનો સ્પ્રે કરો. 3. એફિડ્સ: પીળી ચિકણી જાળ લગાવો, એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી @ 10 લિટર પાણી દીઠ 0.5 ગ્રામ અથવા લીમડાનું તેલ @ 5% છંટકાવ કરો. (સ્રોત: અગ્રી ખેત અને આઈસીએઆર)	પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 1. ફળ બોરર (હેલિકોવરપા આર્મિગેરા): ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5% ડબ્લ્યુજી @ 0.4 ગ્રામ/લિટર અથવા સ્પિનોસાડ 45% એસસી @ 0.3 મિલીલીટર પ્રતિ લિટરનો સ્પ્રે કરો. 2. થ્રિપ્સ અને સ્પાઈડર: વાદળી ચિકણી જાળ @ 5/એકર લગાવો, ફિપ્રોનિલ 5% એસસી @ 1 મિલીલીટર/લિટર અથવા ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% એસએલ @ 0.5 મિલીલીટર/લિટર સ્પ્રે કરો. 3. એફિડ્સ: પીળી ચિકણી જાળ, એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી @ 0.5 ગ્રામ/10 લિટર પાણી અથવા લીમડાનું તેલ @ 5% સ્પ્રે કરો. (સ્રોત: અગ્રી ખેત અને આઈસીએઆર)	પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ	પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Disease Management	Disease Management 1. Damping-off (nursery): Soil drenching with Copper oxychloride 0.25% or Mancozeb 0.25%. 2. Powdery mildew: Spray Hexaconazole 1 ml/L or Sulphur dust @ 20 kg/ha. 3. Fruit rot (Phytophthora): Spray Copper oxychloride 0.3% or Metalaxyl-Mancozeb 0.25% at 10 day intervals. 4. Leaf curl (Mosaic virus): Control whitefly vector using Imidacloprid 0.3 ml/L; remove infected plants. (Source: Agri Khet & Kerala Agriculture)	રોગ મેનેજમેન્ટ 1. ડેમ્પિંગ ઓફ (નર્સરી): 0.25% કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ અથવા 0.25% મેન્કોઝેબ દ્વારા જમીનની સારવાર કરો. 2. પાવડરી ઉંગરાવું: 1 મિલી/લિટર હેક્સાકોનાઝોલ અથવા 20 કિગ્રા/હા. સિંચેલા સલ્ફર પાઉડર નો છિડકાવ કરો. 3. ફળ સડો (ફાયટોફ્થોરા): કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ 0.3% અથવા મેટાલેક્સિલ + મેન્કોઝેબ 0.25% દરમ્યાન 10 દિવસના અંતરે છંટકાવ કરો. 4. પાંદડાં કર્લ / મોઝેક વાયરસ: 0.3 મિલીલીટર ઇમિડાક્લોપ્રિડ દ્વારા વ્હાઈટફ્લાય વેક્ટરનું નિયંત્રણ કરો; ચેપગ્રસ્ત છોડ દૂર કરો. (સ્રોત: અગ્રી ખેત અને કેરળ કૃષિ)	રોગ મેનેજમેન્ટ 1. ડેમ્પિંગ ઓફ (નર્સરી): કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ 0.25% અથવા મેન્કોઝેબ 0.25% દ્વારા જમીનની સારવાર કરો. 2. પાવડરી ફૂગ: હેક્સાકોનાઝોલ 1 મિલી/લિટર અથવા સલ્ફર ડસ્ટ @ 20 કિગ્રા/હેક્ટર. 3. ફળ સડો (ફાયટોફ્થોરા): કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ 0.3% અથવા મેટાલેક્સિલ-મેન્કોઝેબ 0.25% દર 10 દિવસે છંટકાવ કરો. 4. પાંદડાં કર્લ / મોઝેક વાયરસ: 0.3 મિલી/લિટર ઇમિડાક્લોપ્રિડ દ્વારા વ્હાઈટફ્લાય વેક્ટરનું નિયંત્રણ કરો; ચેપગ્રસ્ત છોડ દૂર કરો. (સ્રોત: અગ્રી ખેત અને કેરળ કૃષિ)	રોગ મેનેજમેન્ટ	રોગ મેનેજમેન્ટ	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Harvesting & Yield	Harvesting / Yield First picking at 70–80 days after transplanting. Continue picking at 7–10 day intervals. Yield: Green chilli – 80–100 q/ha, Dry chilli – 20–25 q/ha depending on variety and management.	હાર્વેસ્ટ / ઉપજ રોપણ કે 70-80 દિવસ બાદ પહેલી ચૂંટણી કરો; 7-10 દિવસ કે અંતરાલ પર ચૂંટણી ચાલુ રાખો. ઉપજ: લીલી મરચાં - 80-100 ક્વિન્ટલ/હેક્ટર; સૂકી મરચાં - 20-25 ક્વિન્ટલ/હેક્ટર (વિવિધ અને મેનેજમેન્ટ પર નિર્ભર).	હાર્વેસ્ટ / ઉપજ પહેલી / ઉપજ રોપણી પછી 70-80 દિવસે પ્રથમ ચૂંટણી. 7-10 દિવસના અંતરાલ પર ચૂંટણી ચાલુ રાખો. ઉપજ: લીલા મરચાં - 80-100 ક્વિન્ટલ/હેક્ટર; સૂકા મરચાં - સિંચિયાત અને વ્યવસ્થાપન અનુસાર 20-25 ક્વિન્ટલ/હેક્ટર.	હાર્વેસ્ટ અને ઉપજ	હાર્વેસ્ટ અને ઉપજ	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest Handling Harvest mature, uniform fruits, avoid mechanical damage. Dry chillies under shade or polythene till moisture content is 8–10%. Store in cool, dry, well-ventilated area using gunny bags or polythene-lined sacks.	પાકલણી પછીનું સંચાલન પરિપક્વ, એકસમાન ફળ કાઢો; યાંત્રિક ઇજાને ટાળો. મરચાં ભેજ 8-10% ન થાય ત્યાં સુધી છાંયડામાં અથવા પોલિથિનમાં સૂકવો. ઠંડા, સૂકા, સારી રીતે હવાવાળી જગ્યાએ ગુણીના કોથળાં અથવા પોલિથિનથી અસ્તર કરેલા કોથળાંનો ઉપયોગ કરીને સંગ્રહ કરો.	પાકલણી પછીની કામગીરી પરિપક્વ, એકસમાન ફળ કાઢો; યાંત્રિક ઇજાને ટાળો. મરચાં ભેજ 8-10% ન થાય ત્યાં સુધી છાંયડામાં અથવા પોલિથિનમાં સૂકવો. ઠંડા, સૂકા, સારી રીતે હવાવાળી જગ્યાએ ગુણીના કોથળાં અથવા પોલિથિનથી અસ્તર કરેલા કોથળાંનો ઉપયોગ કરીને સંગ્રહ કરો.	પાકલણી અને સંગ્રહ	પાકલણી અને સંગ્રહ	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ
Disclaimer	These recommendations are based on NAIL, government agencies and trial centres. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	આ ભલામણો કૃષિ વિભાગ, સરકારી એજન્સીઓ અને પરીક્ષણ કેન્દ્રો પર આધારિત છે. વાસ્તવિક પરિણામ જમીનનો પ્રકાર, હવામાન, વિવિધતા અને પાક વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓના આધાર પર બદલાઈ શકે છે.	અસ્વીકરણ	આ ભલામણો કૃષિ વિભાગ, સરકારી એજન્સી અને ટ્રાયલ સેન્ટરો પર આધારિત છે. વાસ્તવિક પરિણામ જમીનનો પ્રકાર, હવામાન, વિવિધતા અને પાક વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓના આધાર પર બદલાઈ શકે છે.	અસ્વીકરણ	અસ્વીકરણ	தமிழ்நாடு	ملاوي.ملاوي	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ	ગુજરાતિ	ગુજરાતિ લિપિ