English	HYBRID CHILLI (NEPOLEAN-5525)	অসমীয়া	মৰাঠী বিৰ্ত (ৰাইজৰ 6828)	নেপালী	ગુજરાતી વિર્ત (ખેડૂતોના 6828)	தமிழ் (முதன்மை)	ಕನ್ನಡ(ಪ್ರಮುಖ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 6828)	ઓડિયા	ઉર્દૂ (ઝોન્સ્ટાર 5525)	ગુજરાતી	તેલુગુ (ઝોન્સ્ટાર 6828)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old cows and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	অগুৱালি শস্যৰ অৱশিষ্ট, আগাছা, পুৰণি গৰু আৰু ৰোগগ্ৰস্ত/ক্ষতিগ্ৰস্ত পাতৰ বস্তু ছাৰ্ছ কৰা। ৰোগ আৰু পোকৰ বাহক কমাবলৈ খেতিৰ সীমাবোৰ পৰিষ্কাৰ ৰাখক।	मागिएको पाकका फाँटहरू, झारपात, पुराना गोरु र बिरामी/क्षतिग्रस्त बिरुवाका अवशेष बुवा गर्नुभन्दा अघि हटाउनुहोस। कीट र रोगको सर्न घटाउन खेतको सिमाना सफा राख्नुहोस।	ગયા પાકના અવશેષ, નીંદણ, જૂના ઢોર અને રોગગ્રસ્ત/ક્ષતિગ્રસ્ત છોડના અવશેષ વાવણી પહેલાં દૂર કરો. જીવાત અને રોગના ફેલાવાને ઘટાડવા ખેતરની સરહદો સ્વચ્છ રાખો.	மாசுபடுதல் தடுப்பு	ಕಳೆ ಕಿತ್ತುವುದು	ઝોન્સ્ટાર (ઝોન્સ્ટાર 6828)	ઝોન્સ્ટાર (ઝોન્સ્ટાર 5525)	ઝોન્સ્ટાર
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.0. Avoid waterlogging, as Chilli is sensitive to excess moisture.	বলুকা দোমট পৰা মাটি, ভালকৈ নিকাহৰ হোৱা, উৰ্বৰ আৰু ভালকৈ জৈৱিক পদাৰ্থ যুক্ত। আদৰ্শ পৰিসৰ প্ৰায়: প্ৰায় 6.0-7.0। অধিক জল ৰখা এৰিব লাগে, কাৰণ মৰিচ অধিক আৰ্দ্ৰতাৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হয়।	बलुवा दोमट माटो राम्रो निकासी भएको, उर्वर र जैविक पदार्थले राम्रो भएको। आदर्श pH दायरा: लगभग 6.0-7.0। पानी जमेर बस्नुबाट बचौं, किनभने मिर्चा अत्यधिक चिसोप्रति संवेदनशील हुन्छ।	લોમ અને રેતાળ લોમ જમીન, સારી રીતે નિકાલ થતી, ફળદ્રૂપ અને સારી કાર્બનિક સામગ્રી ધરાવતી હોવી જોઈએ. આદર્શ pH શ્રેણી: લગભગ 6.0-7.0. મરચાં ભેજ પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોવાથી પાણી ભરાઈ જતું અટકાવો.	மணல் கலந்த களிமண்	ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ	ઝોન્સ્ટાર (ઝોન્સ્ટાર 6828)	ઝોન્સ્ટાર (ઝોન્સ્ટાર 5525)	ઝોન્સ્ટાર
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	মাটিৰ pH, ধৰণ, জৈৱিক কাৰ্বন আৰু মুখ্য-সূক্ষ্ম পুষ্টিৰ বাবে অন্ততঃ এবাৰ প্ৰতি 2-3 বছৰ পৰ এবাৰ মাটি পৰীক্ষা কৰা আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত সাৰ প্ৰয়োগ কৰা।	मिट्टी पीएच, धरण, जैविक कार्बन र मुख्य-सूक्ष्म पोषक तत्वहरूको लागि प्रत्येक २-३ वर्षमा कम्तीमा एउटा माटो परीक्षण गर्नुहोस् र परीक्षण नतिजाहरूमा आधारित मल प्रयोग गर्नुहोस्।	EC, pH, OC અને મેક્રો-માઈક્રો પોષક તત્વો માટે ઓછામાં ઓછા દર 2-3 વર્ષે એક વાર માટી પરીક્ષણ કરો અને પરીક્ષણના પરિણામોના આધારે ખાતર લાગુ કરો.	மண் பரிசோதனை	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Climate Suitability	Climate Requirement Warm-season crop. Temperature: 25–30 °C. Does not tolerate frost or high humidity. Annual rainfall: 625–1500 mm is ideal if well-distributed.	অসমৰ বাবে আদৰ্শ জলবায়ু মাটি ৰ পৰিমাণ বেছি থকাত ভালকৈ 25-30 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ। বছৰ অনুসৰি বৰ ভাল আৰ্দ্ৰতা ৰাখি কাম কৰে। বাৰ্ষিক বৰষুণ 625-1500 মিমি, যদি বৰষুণ বৰ ভাল ভাবে বিতৰিত হয়, তেন্তে আদৰ্শ হয়।	मध्यदेखि तातो हवापानको बाली। तापक्रम: २५–३० डिग्री सेल्सियस। यो हिम वा उच्च आर्द्रतालाई सहन गर्दैन। वार्षिक वर्षा: ६२५–१५०० मिमी राम्रो गरी वितरित गरेमा आदर्श हो।	ગરમ-મોસમ પાક. તાપમાન: 25–30 °C. તે હિમ અથવા ઉચ્ચ ભેજ સહન કરતું નથી. વાર્ષિક વરસાદ: 625–1500 મીમી જો સારી રીતે વિતરિત થાય તો તે આદર્શ છે.	மாறுபடுவது	ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Land preparation	Land Preparation 2–3 deep ploughings followed by harrowing to make fine tilth. Add 20-25 t/ha FYM (farmyard manure) before last ploughing. Raised beds or ridges recommended in heavy soil areas for proper drainage	মাটিৰ প্ৰস্তুতি 2-3 বাৰ গভীৰ জুতাই কৰি মাটি সিহঁতে বিচৰাটো কৰা। এটা মিহি ভুৰ পাবলৈ হেৰো দিয়া। শেষ জুতাই জুতাৰ পূৰ্বে 20-25 টন প্ৰতি হেক্টৰ গোবৰ সাৰ (FYM) যোগ কৰা। ভাৰী মাটিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল নিকাহৰ বাবে উঠা বিছনা বা ৰিজ সুপাৰিশ কৰা হয়।	३–४ गहिरो जोताई गरेपछि माटो राम्रो बनाउन हेरो लगाउनुहोस। अन्तिम जोताइ अघि २०–२५ टन प्रति हेक्टर गोबर मल (FYM) थप्नुहोस। राम्रो निकासीका लागि भारी माटो भएका क्षेत्रमा उठेका बेड वा रिज सिफारिस गरिएका छन।	નમેલી જમીનને 2-3 ઊંડી ખેડવી અને ત્યારબાદ હેરો કરવું. છેલ્લી ખેડ પહેલાં 20-25 ટન/હેક્ટર FYM (ખાતર) ઉમેરો. સારા નિકાલ માટે ભારે જમીનમાં ઉંચા પથારી અથવા રીજની ભલામણ કરવામાં આવે છે.	நிலம் உழுதல்	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Sowing Time	Sowing Time / Season • Nursery sowing: January–February (for summer crop) and June–July (for Kharif). • Seeds Indoor. Throughout the year depending on irrigation. Transplanting after 30–40 days when seedlings are 12–15 cm tall. (Source: Kerala Agriculture Dept & Vikaspedia)	বুলাই বা ৰোপণৰ সময় • নৰ্চাৰ বোৱা: জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰী (গ্ৰীষ্মকালীন শস্যৰ বাবে) আৰু জুন-জুলাই (খৰিফ শস্যৰ বাবে) প্ৰতি বছৰ। • বীজ ঘৰৰ ভিতৰত বছৰ ভৰি যিকোনো সময়তে বোৱা যায়। পাতৰ 12-15 সেমি উচ্চতা হোৱা 30-40 দিনৰ পিছত ৰোপণ কৰা। (উৎস: কেৰল কৃষি বিভাগ আৰু বিকাশপেডিয়া)	मागिएको समय / ऋतु • बिरुवा बिरुवा: नर्सरी उत्पादनको लागि फेब्रुअरी (विस्तारित चक्र भए) वा जून-जुलाई (खरिफ चक्र) मा। • घरभित्र बिरुवा: सिंचाइ गर्न सकेमा वर्षभरि बोन्न सकिन्छ। ३०-४० दिन पछि बिरुवा १२-१५ सेमी हुँदा रोपिएको। (स्रोत: केरल कृषि विभाग र विकासपेडिया)	મરચાંની વિગત / ટનલ • ટનલ સ્પાન: નર્સરી ઉત્પાદનની ઉંચી ઘનતા (વિસ્તરેલ ચક્ર માટે) અને જૂન-જુલાઈ (ખરીફ ચક્ર માટે). • ઇન્ડોર સ્પાન: ઓરડામાં સ્પાનિંગ સંભવ. 3-4 પ્રિડોમિનન્ટ. ઝોન ઉંચો 1.5-2.5 મીટર છે અને ઝોન ઉંચો 1.5 મીટર છે. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ વિભાગ અને વિકાસપેડિયા)	મிளகாய் நடுதல்	ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಸಮಯ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Seed rate & Spacing	Seed Rate / Sowing Method / Spacing Seed rate: 400 grams/ipm-pothole(ed) or 100 g/acre (hybrid). Spacing: 45 cm between rows × 30 cm plants (~4 cm height), cover with shade net. Irrigate lightly until germination. Spacing: 60 × 60 cm for irrigated crops; 75 × 60 cm in rainfed conditions. (Source: Kerala Agriculture Dept.)	বীজ হাৰ / বোৱাৰ পদ্ধতি / ব্যৱধান বীজ হাৰ: 400 গ্ৰাম/ipm (পুখুৰি ভৰোৱা) অথবা 100 গ্ৰাম/একৰ (সংকৰ)। ব্যৱধান: সাৰি বোৱা: 45 সেমি × পাতৰ মাজত 30 সেমি (~4 সেমি উচ্চতা), ছায়া জাল দিয়া। হাল্কাকৈ জল দিয়া, অঙ্কুৰোদ্গম নহাকৈ। সিঞ্চিত শস্যৰ বাবে 60 × 60 সেমি; বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা অৱস্থাত 75 × 60 সেমি। (উৎস: কেৰল কৃষি বিভাগ)	बिरुवा दर / रोपाइ विधि / दूरी बीज दर: ४०० ग्राम/ipm (पुरुष पकेटमा) अथवा १०० ग्राम/हेक्टर (संकर)। दूरी: लाइनमा ४५ सेमी × बिरुवामा ३० सेमी (~४ सेमी उचाइ), छायाको जालले ढाक्नुहोस्। उमाल्नुभन्दा अघि हल्का सिंचाइ गर्नुहोस्। सिंचाइ गरिएका बाली: ६० × ६० सेमी; वर्षाको भरमा: ७५ × ६० सेमी। (स्रोत: केरल कृषि विभाग)	મરચાંની વિગત / ટનલ • ટનલ સ્પાન: નર્સરી ઉત્પાદન (લાંબા ચક્ર માટે) અને જૂન-જુલાઈ (ખરીફ ચક્ર). • ઇન્ડોર સ્પાન: ઓરડામાં સ્પાનિંગ શક્ય છે. 3-4 પ્રિડોમિનન્ટ. ઝોન ઉંચો 1.5-2.5 મીટર છે અને ઝોન ઉંચો 1.5 મીટર છે. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ વિભાગ અને વિકાસપેડિયા)	மிளகாய் நடுதல்	ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಸಮಯ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Seed Treatment	Seed Treatment Treat seeds with Trichoderma viride @ 4 g/kg seed or Pseudomonas fluorescens @ 10 g/kg before sowing to prevent fungal diseases. For chemical treatment: Captan or Thiram @ 2 g/kg seed.	বীজ চিকিৎসা ফাঙ্গাই ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বোৱাৰ আগতে বীজ ট্ৰাইকোডাৰ্মা ভিৰিডে (4 গ্ৰাম/কিলো বীজ) বা স্যুডোমোনাছ ফ্লুৰেচেন্স (10 গ্ৰাম/কিলো বীজ) ৰে চিকিৎসা কৰক। ৰাসায়নিক চিকিৎসাৰ বাবে: কেপ্টান বা থিৰাম (2 গ্ৰাম/কিলো বীজ)।	बीज उपचार फङ्गसको रोकथाम गर्न बोइनु अघि बीजलाई ट्राइकोडर्मा विरिडे (४ ग्राम/किलो बीज) वा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेन्स (१० ग्राम/किलो बीज) ले उपचार गर्नुहोस्। रासायनिक चिकित्साको लागि: क्याप्टान वा थिराम (२ ग्राम/किलो बीज)।	બીજ સારવાર ફૂગથી રક્ષણ આપવા માટે વાવણી પહેલાં બીજને ટ્રાઈકોડર્મા વિરિડે (4 ગ્રામ/કિલો બીજ) અથવા સ્યુડોમોનાસ ફ્લોરેસેન્સ (10 ગ્રામ/કિલો બીજ) સાથે સારવાર કરો. રાસાયણિક સારવાર માટે: કેપ્ટન અથવા થિરામ @ 2 ગ્રામ/કિલો બીજ.	விதை நேர்த்தி	ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Weed Management	Weed Control First hand weeding at 25–30 days after transplanting and second after 50–55 days. Mulching with plastic or organic residues helps control weeds and retain moisture. Avoid deep hoeing near roots.	আগছা নিয়ন্ত্ৰণ ৰোপণ কৰাৰ 25-30 দিন পাছত প্ৰথম কাঁচি কাটা আৰু 50-55 দিন পাছত দ্বিতীয় কাঁচি কাটা কৰক। পলিথিন বা জৈৱিক অৱশেষৰ দ্বাৰা মালচিং কৰাই আগছা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু মাটিত আৰ্দ্ৰতা ৰাখে। মূল ওচৰত গভীৰ কোচন এৰি দিয়া।	नियन्त्रण प्रबंधन पहिलो हातले निराइ-गोडाइ रोपाइ पछि २५-३० दिनमा गरिनुपर्छ, दोस्रो ५०-५५ दिनमा। प्लास्टिक वा जैविक अवशेषहरूले मल्चिङ गर्दा झारपात नियन्त्रण गर्न र चिस्यान राख्न मद्दत गर्छ। जडहरू नजिक गहिरो कोचिङ गर्नुबाट बच्नुहोस्।	નિંદામણ વ્યવસ્થાપન પ્રથમ હાથથી નિંદામણ રોપણ પછી 25-30 દિવસે અને બીજું 50-55 દિવસે કરવું જોઈએ. પ્લાસ્ટિક અથવા કાર્બનિક અવશેષોથી મલ્ચિંગ નીંદણ નિયંત્રણ અને ભેજ જાળવવામાં મદદ કરે છે. મૂળની નજીક ઊંડા કોદાળી મારવાનું ટાળો.	களை நிர்வாகம்	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Fertilizer Management	Fertilizer & Nutrient Management Apply fertilizers based on soil test; general guideline per hectare: • FYM: 20–25 t (basal) • NPK: 160:100:100 kg/ha (N:P:K:K2O) Application schedule: - Full P & K and half N as basal dose before transplanting. - Remaining N in two equal splits — at 30 and 60 days after transplanting. Use Azospirillum and Phosphobacteria @ 2 kg/ha along with organic manure. (Source: Kerala Agriculture & Vikaspedia)	সাৰ আৰু পুষ্টিৰ ব্যৱস্থাপনা মৃত্তিকা পৰীক্ষাৰ ফলাফল অনুসৰি সাৰ প্ৰয়োগ কৰক; প্ৰতি হেক্টৰত সাধাৰণ নিৰ্দেশনা: • গোবৰ সাৰ (FYM): 20-25 টন (আধাৰভূত) • ন্যূনতম: 160:100:100 কিগ্ৰা/হেক্টৰ (N:P:K:K2O) আবেদন কৰা ব্যৱস্থা: - ৰোপণৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ ফস্ফৰস আৰু পটাছ আৰু অৰ্ধেক নাইট্ৰোজেন আধাৰভূত মাত্ৰা হিচাপে দিয়া। - বাকী নাইট্ৰোজেন দুটা সমান ভাগত — ৰোপণৰ 30 আৰু 60 দিন পাছত। জীৱাণু সাৰ (Azospirillum and Phosphobacteria) @ 2 কিগ্ৰা/হেক্টৰ জৈৱিক সাৰৰ সৈতে প্ৰয়োগ কৰক। (উৎস: কেৰল কৃষি আৰু বিকাশপেডিয়া)	उर्वरक र पोषक व्यवस्थापन माटी परीक्षणका आधारमा मल हाल्नुहोस्; सामान्य मार्गदर्शन प्रति हेक्टर: • एफवाईएम (गोबर मल): २०-२५ टन (न्यूनतम) • एनपीके: १६०:१००:१०० किलोग्राम (एन:पी:के:के२ओ) आवेदन तालिका: - रोपाइ पहिले सबै फस्फोरस र पोटाश र आधा नाइट्रोजन आधारभूत मात्रा हो। - बाँकी नाइट्रोजन दुई बराबर भागमा — रोपाइ पछि ३० र ६० दिनमा। एजोस्पिरिलम र फस्फोबाक्टेरिया जैविक मलको साथमा २ किग्रा/हेक्टर प्रयोग गर्नुहोस्। (स्रोत: केरल कृषि र विकासपेडिया)	મલ અને પોષક તત્વોનું વ્યવસ્થાપન માટી પરીક્ષણના આધારે ખાતર નાખો; સામાન્ય માર્ગદર્શન પ્રતિ હેક્ટર: • એફવાયએમ: 20-25 ટન (બેઝલ) • ન્યૂનતમ: 160:100:100 કિગ્રા/હેક્ટર (N:P:K:K2O) અરજી સમયપત્રક: - રોપણ પહેલાં સંપૂર્ણ ફોસ્ફરસ અને પોટાશ અને અડધો નાઈટ્રોજન. - બાકીનું નાઈટ્રોજન બે સમાન ભાગમાં, રોપણ પછી 30 અને 60 દિવસે. એઝોસ્પિરિલમ અને ફોસ્ફોબેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ 2 કિગ્રા/હેક્ટર કાર્બનિક ખાતર સાથે કરો. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ અને વિકાસપેડિયા)	உர நிர்வாகம்	ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Irrigation Management	Irrigation Management Maintain uniform soil moisture; avoid water stress and waterlogging. • Immediately after transplanting: light irrigation. • Vegetative to flowering stage: irrigation every 5-6 days in light soils and 7-10 days in heavy soils. • Reduce frequency of irrigation during flowering and fruit maturity to prevent fruit rot. Drip irrigation improves yield and water efficiency. (Source: KSHEM Karnataka & Kerala Agriculture)	সিঞ্চাই ব্যৱস্থাপনা মাটিত এটা একই ধৰণৰ জল ৰাখক আৰু জল অভাৱ আৰু অধিক জল এৰি দিয়া। • ৰোপণৰ পিছত তুৰন্ত জল দিয়া। • বনস্পতিৰ পৰা ফুলৰ অৱস্থালৈ: হাল্কা মাটিত প্ৰতি 4-5 দিনত এবাৰ আৰু ভাৰী মাটিত 7-10 দিনত এবাৰ সিঞ্চাই কৰক। • ফুলৰ আৰু ফল পকাৰ সময়ত জল সিঞ্চাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰক যাতে ফল বুজি নাযায়। ড্ৰিপ সিঞ্চাই উৎপাদন আৰু পানীৰ দক্ষতা বঢ়ায়। (উৎস: কেএচএম কৰ্ণাটক আৰু কেৰল কৃষি)	সিঞ্চাই ব্যৱস্থাপনা অভিন্ন মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা বজায় ৰাখক; পানীৰ চাপ আৰু অতিশয় পানীৰ চাপ এৰাই চলক। • ৰোপণৰ তুৰন্ত পিছত: হাল্কা সিঞ্চাই। • ভেজেটেটিভ স্তৰৰ পৰা ফুলৰ স্তৰলৈ: হাল্কা মাটিত প্ৰতি 5-6 দিনত একবাৰ আৰু ভাৰী মাটিত 7-10 দিনত একবাৰ। • ফুল আৰু ফল পকাৰ সময়ত সিঞ্চাই কমাওক যাতে ফল ফাটি নাযায়। ড্ৰিপ সিঞ্চাই উৎপাদন আৰু পানীৰ দক্ষতা বঢ়ায়। (উৎস: কেএচএম কৰ্ণাটক আৰু কেৰল কৃষি)	நீர்ப்பாசன மேலாண்மை மண்ணில் சீரான ஈரப்பதத்தைப் பராமரிக்கவும். நீர் பற்றாக்குறை மற்றும் நீர் தேக்கத்தைத் தவிர்க்கவும். • நாற்று நட்ட உடனே: இலேசான நீர்ப்பாசனம். • வெப்ப வளர்ச்சி மற்றும் பூக்கும் பருவம்: லேசான மண்ணில் ஒவ்வொரு 5-6 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும், கனமான மண்ணில் 7-10 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். • பூக்கும் மற்றும் காய் முதிர்ச்சி நிலையில் நீர்ப்பாசனத்தைக் குறைக்கவும். • சொட்டு நீர்ப்பாசனம் மகசூல் மற்றும் நீர் திறனை மேம்படுத்தும். (மூலம்: KSHEM கர்நாடகா & கேரள வேளாண்மை)	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Pest Management	Pest Management 1. Fruit borer (Helicoverpa armigera): Spray Emamectin Benzoate 5% WG @ 0.4 g/L water or Spinosad 45% SC @ 0.3 ml/L 2. Thrips & Mites: Use Blue Sticky Traps @ 5/acre, spray Fipronil 5% SC @ 1 ml/L or Imidacloprid 17.8% SL @ 0.5 ml/L 3. Aphids: Use Yellow Sticky Traps, spray Acetamiprid 20% SP @ 0.5 g/10 L water or Neem oil @ 5%. (Source: Agri Khet & ICAR)	কীট আৰোগ্য 1. ফল ছেদক (হেলিকোৰ্পা আৰ্মিগেৰা): ইমেমেক্টিন বেঞ্জোৱেট 5% ডাব্লুজি @ 0.4 গ্ৰাম/লি পানী অথবা স্পিনোছাদ 45% সিসি @ 0.3 মিলিলিটাৰ/লি ৰে ছিঞ্চক কৰা। 2. থ্ৰিপছ আৰু মাইট: নীলা চিকটিক ফাঁদ @ 5/একৰ ৰাখক আৰু, ফিপ্ৰনিল 5% সিসি @ 1 মিলিলিটাৰ অথবা ইমিডাক্লোপ্ৰিড 17.8% সাচাপ @ 0.5 মিলিলিটাৰ ৰে ছিঞ্চক কৰা। 3. এফিড: হলুদ চিকটিক ফাঁদ ৰাখক, এচেটামিপ্ৰিড 20% এছপি @ 0.5 গ্ৰাম/10 লিটাৰ পানী অথবা নিমতেল 5%। (উৎস: আগ্ৰি খেট আৰু আইচিএৰ)	কীট নিয়ন্ত্ৰণ 1. ফল ছিদ্ৰকাৰক (হেলিকোৰ্পা আৰ্মিগেৰা): ইমামেক্টিন বেঞ্জোৱেট 5% ডব্লিউজি @ 0.4 গ্ৰাম/লিটাৰ পানী অথবা স্পিনোছাদ 45% এছি @ 0.3 মিলিলিটাৰ ৰে ছিঞ্চক কৰা। 2. থ্ৰিপছ আৰু মাইট: ব্লু স্টিকি ট্ৰেপ @ 5/একৰ ৰাখক, ফিপ্ৰনিল 5% এছি @ 1 মিলিলিটাৰ অথবা ইমিডাক্লোপ্ৰিড 17.8% এছএল @ 0.5 মিলিলিটাৰ ৰে স্প্ৰে কৰক। 3. এফিড: ইয়েলো স্টিকি ট্ৰেপ ৰাখক, এচেটামিপ্ৰিড 20% এছপি @ 0.5 গ্ৰাম/10 লিটাৰ পানী অথবা নিমতেল 5%। (উৎস: আগ্ৰি খেট আৰু আইচিএৰ)	કીટ વ્યવસ્થાપન 1. ફળ વેધક (હેલિકોર્પા આર્મિગેરા): ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5% ડબ્લ્યુજી @ 0.4 ગ્રામ/લિટર પાણી અથવા સ્પિનોસાડ 45% એસસી @ 0.3 મિલીલિટર/લિટર સ્પ્રે કરો. 2. થ્રિપ્સ અને જીવાત: વાદળી ચીકણી જાળ @ 5/એકર મૂકો, ફિપ્રોનિલ 5% એસસી @ 1 મિલીલિટર/લિટર અથવા ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% એસએલ @ 0.5 મિલીલિટર/લિટર સ્પ્રે કરો. 3. એફિડ: પીળી ચીકણી જાળ મૂકો, એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી @ 0.5 ગ્રામ/10 લિટર પાણી અથવા લીમડાનું તેલ 5%. (સ્રોત: આગ્રી ખેટ અને આઈસીએઆર)	பூச்சி கொல்லிகள்	ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Disease Management	Disease Management 1. Damping-off (nursery): Soil drenching with Copper oxychloride 0.25% or Mancozeb 0.25%. 2. Leaf curl (whitefly): Spray Hexaconazole 1 mL or Sulphur dust @ 20 kg/ha. 3. Fruit rot (Phytophthora): Spray Copper oxychloride 0.1% or Metalaxyl-Mancozeb 0.25% at 10-day intervals. 4. Leaf curl / Mosaic virus: Use resistant varieties (Kiranmayi using Imidacloprid 0.3 mL); remove infected plants. (Source: Agri Khet & Kerala Agriculture)	ৰোগ আৰোগ্য 1. পেনিচিলিয়াম ক্ৰাইচিচ (নাৰ্চাৰি): মাটিৰ ড্ৰেনিং কপাৰ অক্সিক্লোৰাইড 0.25% বা মেনকোজেব 0.25% ৰে কৰা। 2. পাতাৰ কোঁচা (বগৰী): হেক্সাকোনাজোল 1 মিলি বা সালফাৰ ডাষ্ট @ 20 কিগ্ৰা/হেক্টৰ ৰে ছিঞ্চক কৰা। 3. ফলৰ পচনি (ফাইটোফথোৰা): কপাৰ অক্সিক্লোৰাইড 0.1% বা মেটালাক্সিল-মেনকোজেব 0.25% প্ৰতি 10 দিনৰ অন্তৰে ছিঞ্চক কৰা। 4. পাতাৰ কোঁচা / মোজেক ভাইৰাছ: ইমিডাক্লোপ্ৰিড 0.3 মিলিলিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিৰোধী জাত (কিৰণময়ী) ব্যৱহাৰ কৰক; সংক্ৰমিত গাছ আঁতৰাই পেলাওক। (উৎস: আগ্ৰি খেট আৰু কেৰল কৃষি)	ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ 1. পেনিচিলিয়াম ক্ৰাইচিচ (নাৰ্চাৰি): মাটিত কপাৰ অক্সিক্লোৰাইড 0.25% বা মেনকোজেব 0.25% প্ৰয়োগ কৰক। 2. পাতাৰ কোঁচা (হোৱাইটফ্লাই): হেক্সাকোনাজোল 1 মিলিলিটাৰ প্ৰয়োগ কৰক বা সালফাৰ ডাষ্ট @ 20 কিগ্ৰা/হেক্টৰ ৰে ছিঞ্চক কৰা। 3. ফল পচা (ফাইটোফথোৰা): কপাৰ অক্সিক্লোৰাইড 0.1% বা মেটালাক্সিল-মেনকোজেব 0.25% প্ৰতি 10 দিনত ছিঞ্চক কৰা। 4. পাতাৰ কোঁচা / মোজেক ভাইৰাছ: প্ৰতিৰোধী জাত (কিৰণময়ী) ব্যৱহাৰ কৰক (ইমিডাক্লোপ্ৰিড 0.3 মিলিলিটাৰ); সংক্ৰমিত গাছ আঁতৰাওক। (উৎস: আগ্ৰি খেট আৰু কেৰল কৃষি)	રોગ વ્યવસ્થાપન	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Harvesting & Yield	Harvesting / Yield First picking at 70–80 days after transplanting. Continue picking at 7–10 day intervals. Yield: Green chilli – 80–100 q/ha, Dry chilli – 20–25 q/ha depending on variety and management.	অমাৰ্জ / উৎপাদন ৰোপণৰ পিছত 70-80 দিনৰ পাছত প্ৰথমটো অমাৰ্জ কৰক। 7-10 দিনৰ অন্তৰালত অমাৰ্জ কৰা অব্যাহত ৰাখক। উৎপাদন: কাঁচা মিৰ্চা – 80-100 কুইন্টল/হেক্টৰ; শুকনা মিৰ্চা – 20-25 কুইন্টল/হেক্টৰ (জাত আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল)।	অমাৰ্জ / উৎপাদন প্ৰথমটো ৭০-৮০ দিনৰ পাছত তুলিব লাগে। ৭-১০ দিনৰ ব্যৱধানত তুলিব থাকিব লাগে। উৎপাদন: কাঁচা মিৰ্চা – ৮০-১০০ কুইন্টল/হেক্টৰ; শুকনা মিৰ্চা – ২০-২৫ কুইন্টল/হেক্টৰ (জাত আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল)।	અમાર્જન / ઉપજ રોપણ પછી 70-80 દિવસ પછી પ્રથમ ચૂંટણી કરો. 7-10 દિવસના અંતરાલે ચૂંટણી ચાલુ રાખો. ઉપજ: લીલી મરચી – 80-100 ક્વિન્ટલ/હેક્ટર; સૂકી મરચી – 20-25 ક્વિન્ટલ/હેક્ટર (જાત અને વ્યવસ્થાપન પર આધાર રાખે છે).	அறுவடை மகசூல்	ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest Handling Harvest mature, uniform fruits, avoid mechanical damage. Dry chillies under shade or polyhouse till moisture content is 8-10%. Store in cool, dry, well-ventilated area using gunny bags or polythene-lined sacks.	অমাৰ্জ ৰ পাছৰ পৰিচালনা পকা ফল, সমানভাৱে ৰঙা হোৱা মিৰ্চা তুলিব প্ৰতিটো ফল। মিৰ্চা ৰদ আৰু বা পলিহাউছত ৰাখি তেজ হ্ৰাস হোৱা তেজ কমাই নিব লাগে 8-10% ৰ বা তাতকৈ কম। ঠাণ্ডা, শুকনা আৰু ভালকৈ বায়ুসঞ্চালন থকা ঠাইত গুনি বেগ বা পলিথিনৰ ভৰি ব্যৱহাৰ কৰি মিৰ্চা সংৰক্ষণ কৰক।	অমাৰ্জনোত্তৰ হেন্ডলিং ৰাতিৰ ঠাণ্ডা সময়তে পকা, একৰূপ ফল তুলিব লাগে। শুকনা মিৰ্চা ৮-১০% ৰ তলত নাপাওঁতে ছায়াত বা পলিথিনৰ তলত শুকাব লাগে। ঠাণ্ডা, শুকনা আৰু ভালকৈ বায়ুচলাচল থকা ঠাইত গুনি বেগ বা পলিথিন ৰে ৰখা বস্তাত সংৰক্ষণ কৰক।	અનુગ્રહ પછી પ્રક્રિયા અને સંગ્રહ પરિપક્વ, એકસમાન ફળ તોડો અને યાંત્રિક નુકસાન ટાળો. ભેજ 8-10% સુધી ઘટાડવા માટે છાંયડામાં અથવા પોલીહાઉસમાં સૂકવો. ઠંડા, સૂકા અને સારી રીતે હવાઉજાસવાળા વિસ્તારમાં ગુણી અથવા પોલીથીન-લાઈન કરેલી બોરીઓમાં સંગ્રહ કરો.	அறுவடைக்கு பிந்தைய கையாளுதல் மற்றும் சேமிப்பு	ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર	ઝોન્સ્ટાર
Disclaimer	These recommendations are based on KVK's, government agencies and trial centres. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	এই সিফাৰিশসমূহ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, চৰকাৰী সংস্থা আৰু পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে। প্ৰকৃত ফলাফল মাটিৰ ধৰণ, জলবায়ু, বিভিন্ন জাত আৰু শস্য ব্যৱস্থাপনাৰ পদ্ধতিসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰিবৰ্তিত হব পাৰে।	यस सिफारिसहरू कृषि विज्ञान केन्द्र, सरकारी संस्था र परीक्षण केन्द्रहरूको डाटामा आधारित छन्। वास्तविक परिणामहरू माटीको प्रकार, हावापानी, विविधता र बाली व्यवस्थापन पद्धतिहरूमा निर्भर हुन सक्छन्।	આ ભલામણો કૃષિ વિજ્