PRACTICES	HYBRID CAPSICUM (RED BEAUTY)	ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ	ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರ ಸಿಗೆ (ಇ ಅಳತೆ)	ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ	ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ಸಿಗೆ (ಇ ಅಳತೆ)	ಹಿಂದಿ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್	ತೆಲುಗು (ఇంగ్లీషు / తెలుగు)	ತಮಿಳು	ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವರ (இங்கிலீஷ் / தமிழ்)	ಮಲೆಯಾಳಂ	ಮಲೆಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ವಿವರ (ഇംഗ്ലീഷ് / മലയാളം)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ಹೊಲ ಶುಚಿ	ಬೂತ್ತಿ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಕಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಕಂಡಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಹೊಲ ಶುಚಿ ಮಾಡಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.	ಸ್वच्छ शेत	ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	ಶೇತ ಸ್वच्छता	ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	விதைப்பிற்கு முன், முந்தைய பயிர்களின் எச்சங்கள், களைகள், பழைய கொடிகள் மற்றும் நோய் தாக்கியிருந்தால் அந்த தாவரப் பொருட்களை அகற்றி வையுங்கள். பூச்சி மற்றும் நோய் பரவலைத் தவிர்க்க, வயலின் வரப்புகளைச் சுத்தமாகக் பராமரிக்கவும்.	ഒരു പൊടുക്കാം	ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ലഭ്യമല്ല
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 5.5-6.5. Avoid waterlogging, as Capsicum is sensitive to excess moisture.	ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ	ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಜಿಗಟು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಾದುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ pH ಸೂಚ್ಯಂಕ 5.5-6.5 ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.	मातीचा प्रकार	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	மணல் கலந்த வண்டல் மண் முதல் வண்டல் மண் வரை, நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள, வளமான, மற்றும் சிறந்த கரிமச்சத்துக்கள் கொண்ட மண் உகந்தது. pH அளவு சுமார் 5.5-6.5. குடைமிளகாய் அதிகப்படியான ஈரப்பதத்திற்கு உணர்திறன் கொண்டது என்பதனால், நீர் தேங்குவதைத் தவிர்க்கவும்.	മണ്ണ് വൃത്തിയുള്ളതും നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ളതും ജൈവാംശം കൂടിയതും ആയിരിക്കണം. pH സൂചിക 5.5-6.5 ആണ് അനുയോജ്യം. കുടമുളകിന് അധിക ഈർപ്പം ഒഴിവാക്കുക.
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2–3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.	माती परीक्षण	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	माती परीक्षण	ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	EC, pH, OC ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.	மண் பரிசோதனை	EC, pH, OC மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள், நுண்ணூட்டச் சத்துக்கள் ஆகியவற்றுக்காக, குறைந்தபட்சம் 2-3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையாவது மண் பரிசோதனை செய்து, பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரமிடவும்.	ഒരു വിള	ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ലഭ്യമല്ല
Climate Suitability	Climate / Weather Requirement Capsicum prefers moderate conditions: daytime ~26-30 °C, night ~16-18 °C for optimum fruit set. It is less tolerant of extreme heat or prolonged cold.	ಹವಾಮಾನ	ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕಾಲಗುಣ ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹಗಲು ಸಮಯ 26-30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ 16-18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಹೂವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಹಕಾರಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಚಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.	मौसमाचा प्रकार	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	காலநிலை / வானிலை தேவை குடைமிளகாய் மிதமான சூழலை விரும்பினாலும் உகந்த காய்ப்புக்கு பகலில் ~26-30 °C, இரவில் ~16-18 °C இது அதீத வெப்பத்துக்கோ அல்லது நீண்ட கால குளிர்ச்சியோ குறைவாகவே தாங்கும்.	हवामान/ वातावरण	ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	വെയിലുള്ള / വെയിലല്ലാത്ത കുടമുളകിന് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിലുള്ള ഉഷ്ണം ~26-30 °C, രാത്രിയിൽ ~16-18 °C ആണ് നല്ലത്. അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ചൂടിനെയോ തണുപ്പിനെയോ ഇതിന്നു അത്ര നല്ലതല്ല.
Land preparation	Land Preparation Plough/harrow to fine tilth. Incorporate well-decomposed FYM or compost (~20-25 t/acre) during final land preparation. Form beds/ridges if needed for drainage.	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಭೂಮಿಯ ಹದ ಮಾಡಿ ಸಾಲು ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲು ಹೊಡೆಯಬೇಕು.	जमीन तयारी	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	நிலம் தயாரித்தல் ஆண்டியால் நன்கு பண்படுத்தப்பட்ட இறுதி நிலம் தயாரிப்பின் போது நன்கு மக்கிய பொருட்ட உரம் அல்லது கம்போஸ்டை சேர்த்து மண்ணோடு கலப்பதும், தேவைப்பட்டால் பாத்தி அமைப்பதும் நல்லது.	നിലം ഒരുക്കുക	ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ലഭ്യമല്ല
Sowing Time	Sowing Time / Season Typical sowing in nursery, end of October; transplanting in mid-February for open fields. For early crop: sow mid-October, transplant late November	ಬಿತ್ತನೆ ಇರುವ ಕಾಲ	ಬಿತ್ತನೆ ಇರುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನರ್ಸರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ಬರುವ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.	बुवाई का समय	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	நாற்றங்கால் ஆகஸ்ட் / அக்டோபர் இறுதி; திறந்த வெளிகளில் பிப்ரவரி நடுப்பகுதியில் நாற்று நடுதல். முன்கால பயிருக்கு: அக்டோபர் நடுப்பகுதியில் விதைத்து நவம்பர் இறுதியில் நாற்று நடவும்.	നഴ്സറി സമയം	ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ലഭ്യമല്ല
Seed rate & Spacing	Seed Rate / Sowing Method / Spacing Seed rate: ~200-300 g per acre. Sowing depth: ~2-4 cm. Spacing: Row-to-row: ~50-60 cm and plant-to-plant ~30-40 cm (for field crop) or as per ridge/bed system.	ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅಂತರ	ಬೀಜ ದರ / ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಿ / ಅಂತರ ಬೀಜ ದರ: ~200-300 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: ~2-4 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಂತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ~50-60 ಸೆ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ~30-40 ಸೆ.ಮೀ. (ಹೊಲದ ಬೆಳೆ) ಅಥವಾ ಇಳುವರಿ ಬೆಡ್ಡಿನ ಪ್ರಕಾರ.	बीज दर और बोने का अंतर	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	விதைப்பு வீதம் மற்றும் இடைவெளி	ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	ബീജം വിതയ്ക്കേണ്ട അളവ്
Seed Treatment	Seed Treatment / Fungicide Treat seeds with Thiram/Captan @ ~2 g/kg seed before sowing to reduce seed-borne diseases.	ಬೀಜ ಶುದ್ಧತೆ	ಬೀಜ ಶುದ್ಧತೆ / ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣ ಗಿಡಗಳ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಥೀರಮ್ / ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್ ~2 g/kg ಬಳಸಿ ಬೀಜ ಶುದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.	बीज प्रक्रिया	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	விதை சுத்திகரிப்பு	ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	വിത്ത് ചികിത്സ
Weed Management	Weed Control Keep crop weed-free especially during early growth. Two weedings recommended: first ~30 days after transplanting, second ~40 days after.	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮೊದಲನೆಯದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ನಂತರ ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ.	खरपतवार प्रबंधन	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	ஆரம்ப நாட்களில் பயிரை களை இல்லாமல் வைத்திருக்கவும். இரண்டு முறை களையெடுப்பதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது: முதல் முறை நாற்று நட்ட சுமார் 30 நாட்களுக்குப் பிறகும், இரண்டாவது முறை சுமார் 40 நாட்களுக்குப் பிறகும்.	കളനിയന്ത്രണം	ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ലഭ്യമല്ല
Fertilizer Management	Fertilizer & Nutrient Management Example per acre: • FYM/compost: 20-25 t/ac. • Nitrogen: ~50 kg/ac, 25 kg/ (K_2O 12 kg per acre (approx) i.e. Urea ~110 kg/acre, SSP ~175 kg/acre, MOP ~20 kg/acre. (~ Full P & K & 1/3 N at planting; then remaining N in two splits one and two months after transplanting.)	ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಉದಾಹರಣೆ: • ಸಗಣಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್: 20-25 ಟನ್‌ಗಳು/ಎಕರೆ. • ಸಾರಜನಕ: ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಗ್ರಾ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ, 25 ಕಿಲೋ / (K_2O 12 ಕಿ.ಗ್ರಾ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ (ಅಂದಾಜು) ಅಂದರೆ ಯೂರಿಯಾ ಸುಮಾರು 110 ಕಿ.ಗ್ರಾ. ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ~175 ಕಿ.ಗ್ರಾ./ಎಕರೆ, ಪೊಟಾಷ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ~20 ಕಿ.ಗ್ರಾ./ಎಕರೆ. (~ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊಟಾಷ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡಿ; ಉಳಿದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ.)	उर्वरक प्रबंधन	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	உரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை உரம் அளவு எடுத்துக்காட்டு: • தோராய உரம்/மக்கிய உரம்: ஒரு ஏக்கருக்கு 20-25 டன். • உரம்: ஒரு ஏக்கருக்கு ~ 50 கி.கி. / 25 கி.கி. / (K_2O 12 கி.கி. ஒரு ஏக்கருக்கு (தோராயமாக) அதாவது, யூரியா ~110 கிலோகிராம்/ஏக்கர், எஸ்.எஸ்.பி -175 கிலோகிராம்/ஏக். எம்.ஓ.பி -20 கிலோகிராம்/ஏக். (~ நடவு செய்யும் போது முழுமையான பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் மற்றும் 1/3 பங்கு எஞ்சட்ரஜன்; பின்னர் மீதமுள்ள எஞ்சட்ரஜனை நாற்று நட்ட பின் ஒரு மாதம் மற்றும் இரண்டு மாதங்களில் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரித்துக் கொடுக்கவும்.)	ഉപയോഗം & വിവരണം വിതച്ചതോ	ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
Irrigation Management	Irrigation Management First irrigation immediately after transplanting. Thereafter: in hot weather every ~4-5 days; in cooler weather every ~7-8 days. Maintain uniform moisture, avoid water-stress and waterlogging.	ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಮಾಣ	ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನಂತರ: ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಮಾರು ~4-5 ದಿನಗಳಿಗೆ; ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ~7-8 ದಿನಗಳಿಗೆ. ಸಮಪ್ರಮಾಣದ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.	सिंचाई व्यवस्थापन	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	நீர்ப்பாசன மேலாண்மை நாற்று நட்ட உடனேயே முதல் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். அதன்பிறகு: வெப்பமான காலநிலையில் சுமார் 4-5 நாட்களுக்குக் ஒருமுறையும், குளிர்ச்சியான காலநிலையில் சுமார் 7-8 நாட்களுக்குக் ஒருமுறையும். சீரான ஈரப்பத்தைப் பராமரிக்கவும். நீர் பற்றாக்குறையும் மற்றும் நீர் தேக்கத்தைத் தவிர்க்கவும்.	నీటిపారుదల నిర్వహణ	తమిళ భాషలో వివరాలు అందుబాటులో లేవు
Pest Management	Pest Management Common pests and control: • Fruit-borer: Spray e.g. Chlorantraniliprole or Spinosad. • Thrips, Aphids, Whitefly: Use yellow/blue sticky traps; spray appropriate insecticides.	ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: • ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯ ಹುಳು: ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿನೋಸಾದ ಹಾಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. • ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹುಳು: ಅಫಿಡ್ಸ್/ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈ: ಹಳದಿ/ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜಿಗಟು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ; ಸೂಕ್ತ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.	कीड़े व नियंत्रण	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	பூச்சி மேலாண்மை பொதுவான பூச்சிகளும் கட்டுப்பாடும்: • பழத்துளைப்பான்: குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் அல்லது ஸ்பினோசாட் போன்றவற்றைத் தெளிக்கவும். • த்ரிப்ஸ், அஃபிட்கள், வெள்ளை ஈ: மஞ்சள்/நீல நிற ஒட்டும் பொறிகளைப் பயன்படுத்தவும்; பொருத்தமான பூச்சிக்கொல்லிகளை தெளிக்கவும்.	കീടങ്ങൾ & നിയന്ത്രണം
Disease Management	Disease Management Key diseases and treatments: • Powdery mildew (Colletotrichum capsici): Use disease-free seeds; spray with suitable fungicides (e.g., Indoxil M-45 or copper mixture) at onset and 3-4 times at 10-15 day intervals. • Leaf-curl / Mosaic virus: Control whitefly, rogue out infected plants.	ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಪ್ರಮುಖ ರೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: • ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಲೆ (ಕೊಲೆಟೊಟ್ರಿಕಮ್ ಕೆಪ್ಸಿಸಿ): ರೋಗಮುಕ್ತ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು (ಉದಾ. ಇಂಡಿಕ್ಸಿಲ್ M-45 or ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ್ರಣ) ಬಳಸಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 10-15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3-4 ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. • ಎಲೆ ಸುರುಳಿ/ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್: ರೋಗಪೀಡಿತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.	रोग व नियंत्रण	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	நோய் மேலாண்மை முக்கிய நோய்களும் அதற்கான சிகிச்சைகளும்: • பழ அழுகல் (Colletotrichum capsici): நோய்களற்ற விதைகளைப் பயன்படுத்தவும்; சூழல் தொடங்கியவுடன் மற்றும் 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் (உதா. இண்டோ.எம் (அல்லது) எம்-45) அல்லது தாமிரக் கலவைகள் தெளிக்கவும். (மேலும் 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் 3-4 முறை தெளிக்கவும்).	നോയ്ക്കും നിയന്ത്രണവും	ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ലഭ്യമല്ല
Harvesting & Yield	Harvesting / Yield Harvest when fruits are fully developed and still green for long-distance market, coloured stage for local market. Harvest begins ~60-75 days after transplanting.	ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ	ಕಟಾವು / ಇಳುವರಿ ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ~60-75 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಟಾವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.	कटाई / उपज	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	அறுவடை / மகசூல் தொலைவுக்குச் சந்தைகளுக்கு, காய்கள் முழுமையாக வளர்ந்து பச்சையாக இருக்கும்போதும், உள்ளூர் சந்தைக்கு, நிறம் வந்த பிறகும் அறுவடை செய்யவும். நாற்று நட்ட ~60-75 நாட்கள் ஆன பிறகு அறுவடை தொடங்குகிறது.	കൊയ്ത്ത് & വിളവ്	ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ലഭ്യമല്ല
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest Handling Sort/grade by size, colour, quality. Pack in ventilated crates/boxes. Store at ~7-10 °C for up to ~3 weeks (if required).	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ	ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕ್ರೇಟ್‌ಗಳು/ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ~7-10 °C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ~3 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ).	काढ़ने के बाद की प्रक्रिया	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	காய்கறிகள் சேமிப்பு	ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	വിളവെടുപ്പിനു ശേഷം സൂക്ഷിക്കുന്നതും സംഭരിക്കുന്നതും
Disclaimer	These recommendations are based on SAUs, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	ಅಸ್ವೀಕಾರ	ಇ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ, ತಳಿಗಳು, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಳತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.	अस्वीकरण	ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	ஸ்வீகரிப்பு	ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ವಿವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ	ഈ ശുപാർശകൾ SAUs, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, ട്രയൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മണ്ണിന്റെ തരം, കാലാവസ്থ, ഇനം, വിളകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായേക്കാം.