

Practices	HYC CUMBER (ROCK STAR)	ಮಾಹಿತಿ	ನೀರಿನ ತೀರ (ರೀತಿಯ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ನೀರಿನ ತೀರ (ರೀತಿಯ)	ಗುಣಮಟ್ಟ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Food hygiene	Always wash your hands before, after, and around food preparation. Use clean cloths to wipe down food surfaces. Keep the handles of food cans in clean paper covers every time.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Soil requirement	Soils should be free and well-aerated. Soils with good drainage should be used. Avoid soils with high clay content. Cucumber is sensitive to water logging.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, and NPK. Results can help you adjust the soil for the crop. Soil testing is essential for the crop.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Climate suitability	Climate: "Moderate Requirement Temperature Optimum 21 - 31°C. Rainfall: 1200-1500 mm annually for the crop. Soiling temperature: 22-30°C."		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Land preparation	Land Preparation: Undertake 1-2 ploughings and harrowings to achieve the 600-800mm depth and 1700 (average) rows per hectare. The soil should be free and well-aerated.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Seeding Time	Seeding Time: From sowing to planting, cucumber seedling may be ready for early yield.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Seed rate & Spacing	Seeding: Seed Rate - Sowing Method: Spacing: Beds of width 2.1m. Seed Rate: 1.5 kg per acre. Sowing depth: 2-3 cm.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Seed Treatment	Seed Treatment: Treat seeds before sowing with a suitable chemical such as Captan @ 2 gm/kg seed for 30 minutes to protect against seed-borne diseases.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Weed Management	Weed Management: Remove weeds manually or use 0.1% Glyphosate. Apply herbicide after sowing. Use mulch to suppress weeds. Weed management is essential for the crop.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Fertilizer Management	Weed Control: Use manual weeding and/or chemical control. Example: Glyphosate @ 1.5 liter per 1000m <sup>2</sup> for weeding rows.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Irrigation Management	Irrigation: Irrigation system is required in summer. Apply 10-12 mm water daily. Water stress is common in the crop. Irrigation is essential for the crop.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Pest Management	Pest Management: Fruit fly, aphids, cucumber beetle, Nematode are common pests. Neem oil (2% concentration) is effective against fruit fly.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Disease Management	Disease Management: Prevent diseases with fungicides (copper fungicides etc.) and other disease control (copper fungicides, copper and zinc). Disease management is essential for the crop.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Harvesting & Yield	Harvesting: Yield: The crop starts yielding about 45-50 days after sowing. Harvesting starts from 10-12 ploughing and sowing. Yield: 10-12 t/ha.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Pest Resistance Management & Storage	Pest Resistance & Storage: Store cucumbers in cool, dry place. Avoid storage in wet, humid conditions. Storage temperature: 10-12°C. Storage life: 10-12 days.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
Conclusion	These recommendations are based on SAIS, government agencies and local sources. Avoid storage in wet, humid conditions. Storage temperature: 10-12°C. Storage life: 10-12 days.		ಪುಟ್ಟ ಕುಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)