English	HYBRID CHILLI (SEAMONS DELUXE)	मराठीमध्ये	मुख्य टिपे (विशेष विभाग)	गुजराती	ગુજરાતી ટિપ્સ (વિશેષ વિભાગ)	தமிழ் - முதன்மை குறிப்புகள்	ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ (ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ)	ఇంగ్లీష్ మీడియం (ప్రత్యేక విభాగం)	ગુજરાતમાં	ગુજરાત ટિપ્સ (વિશેષ વિભાગ)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old cows and diseased damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	मुळांसह मागील पिकांचे अवशेष, तण, जुनी गुरांची शेणे आणि रोगग्रस्त/खराब झालेले वनस्पती साहित्य पेरणी करण्यापूर्वी काढून टाका. कीड आणि रोग पसरू नये म्हणून शेताच्या बांधाच्या कडा स्वच्छ ठेवा.	**पेरणी पश्चात**	મૂળ સહિત પાકના અવશેષો, નકામું ઘાસ, જૂનાં ગોબર અને રોગગ્રસ્ત/નુકસાનગ્રસ્ત છોડની સામગ્રી વાવણી પહેલાં દૂર કરો. જીવાત અને રોગને ફેલાતાં અટકાવવા માટે ખેતરની બાંધાની કડાને સ્વચ્છ રાખો.	**વાવણી પછીનું**	**ஆரம்ப சுகாதாரம்**	ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಕಳೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	**విత్తనానికి ముందు**	**ஆரம்ப சுகாதாரம்**	ఇంగ్లీష్ మీడియం
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.0. Avoid waterlogging, as Chilli is sensitive to excess moisture.	चांगला सेंद्रिय कर्ब असलेली, भरपूर निचरा होणारी, सुपीक, वाळू मिश्रित चिकणमाती पोयटा. आदर्श पीएच श्रेणी: अंदाजे 6.0-7.0. जास्तीत जास्त पाणी, मिरची जास्तीच्या ओलेपणाला संवेदनशील असल्याने साचलेले पाणी टाळा.	**पेरणीनंतर पहिलीच**	ગરમાંથી મધ્યમ કાળી, સારી રીતે નિકાલવાળી, ફળદ્રુપ, સારા સેન્દ્રિય પદાર્થવાળી. આદર્શ pH શ્રેણી: આશરે 6.0-7.0. પાણી ભરાવાનું ટાળો, કારણ કે મરચું વધુ પડતા ભેજ પ્રતિ સંવેદનશીલ છે.	**மண் தேவை**	ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ ಮಣ್ಣು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ, ಫಲವತ್ತಾದ, ಉತ್ತಮ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥವಿರುವ ಮಣ್ಣು. ಆದರ್ಶ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.0. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	**మట్టి రకం**	ఇసుక లోమ్ నేల, బాగా నీరు పారే, సారవంతమైన, మంచి సేంద్రియ పదార్థం కలిగి ఉండాలి. ఆదర్శ pH పరిధి: సుమారు 6.0-7.0. మిరపకాయ మొక్కలు అధిక తేమకు సున్నితంగా ఉన్నందున నీరు నిలవకుండా చూడండి.	**மண் வகை**
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on soil results.	मिरची ही हलकी, पोयटा, आदर्श ओल असलेल्या जमिनीत चांगले उत्पादन देते. जास्त पाऊस असल्यास उंच ठिकाणी लागवड करा आणि अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करण्यासाठी चरी खोदा.	**चांगले पीक**	EC, pH, OC અને મેક્રો-માઈક્રો પોષક તત્વો માટે ઓછામાં ઓછા દર 2-3 વર્ષે એક વાર માટી પરીક્ષણ કરો અને માટી પરીક્ષણના પરિણામોના આધારે ખાતર નાખો.	**மண் பரிசோதனை**	ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ	ఇంగ్లీష్ మీడియం
Climate Suitability	Climate Requirement Water-season crop. Temperature: 25-30 °C. Does not tolerate frost or high humidity. Annual rainfall: 625-1500 mm is ideal if well-distributed.	अवजड माती आणि काळ्या जमिनीत चांगले उत्पादन देणारे. 25-30 डिग्री सेल्सियस: वाढ व फळ धरणे आदर्श श्रेणी. पाऊस: वार्षिक सरासरी 625-1500 मिमी, जोपर्यंत समान रूपे वितरीत होत आहे.	**पावसाळी**	આબોહવાની આવશ્યકતા તાપમાન: ગરમી પાક. તાપમાન: 25-30 °C હિમ કે ઉચ્চ ભેજ સહન કરતું નથી. વાર્ષિક વરસાદ: 625-1500 મીમી જો સારી રીતે વિતરિત થતા હોય તો તે આદર્શ છે.	**காலநிலை பொருத்தம்**	ಮಳೆಗಾಲದ ಬೆಳೆ ತಾಪಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಾಪಮಾನ: 25-30 °C. ಮಂಜು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ: 625-1500 ಮಿಮೀ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸೂಕ್ತ.	**వాతావరణ అవసరం**	**காலநிலை பொருத்தம்**
Land preparation	Land Preparation 2-3 deep ploughings followed by harrowing to make fine tilth. Add 20-25 t/ha FYM (farmyard manure) before last ploughing. Raised beds or ridges recommended in heavy soil areas for proper drainage.	मुळांचे तीन तेरी 2-3 खोल नांगरणी करून माती चांगल्या रिकामी करावी आणि शेतात शेणखत (FYM) 20-25 टन/हेक्टर मिसळा. जड जमिनीत चांगल्या निचऱ्यासाठी उंच वरंबे किंवा रिजवर लागवड करा.	**मुळांचे तीन तेरी**	જમીનની તૈયારી 2-3 ઊંડી ખેડાણ પછી ખેડાણ કરીને સારી ટિલ્થ બનાવો. છેલ્લી ખેડાણ પહેલાં 20-25 ટન/હેક્ટર FYM (ફાર્મયાર્ડ ખાતર) ઉમેરો. ભારે જમીનમાં યોગ્ય ડ્રેનેજ માટે ઉંચા બેડ અથવા રિજની ભલામણ કરવામાં આવે છે.	**நிலம் தயார்**	ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆ 2-3 ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ನಂತರ ಹರಗುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲು. ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಗೆ ಮುಂಚೆ 20-25 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ FYM (ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ) ಸೇರಿಸಿ. ಭಾರೀ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	**నేల తయారీ**
Sowing Time	Sowing Time / Season • Nursery sowing: January-February (for summer crop) and June-July (for Kharif). • Seeds Indoor: Throughout the year depending on irrigation. Transplanting after 30-40 days when seedlings are 12-17 cm tall. (Source: Kerala Agriculture Dept & Vikaspedia)	मुळांचे बियाणे • उन्हाळा हंगाम: जानेवारी ते फेब्रुवारी (उन्हाळ्यात लागवड केलेल्या पिकासाठी) आणि जून-जुलैमध्ये (खरीप हंगामासाठी). • इनडोअर बियाणे: सिंचनावर अवलंबून असणारे वर्षभर. • पहिली पाने दिसल्यानंतर 30-40 दिवसांनी रोपे 12-15 सेमी उंच असताना लागवड करावी.	**मुळांचे बियाणे**	બીજ વાવણી • ઉનાળાની સીઝન: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી (ઉનાળાની સીઝનમાં વાવેલા પાક માટે) અને જૂન-જુલાઈ (ખરીફ પાક માટે). • ઇન્ડોર બીજ: સિંચાઈના આધારે વર્ષભર વાવેલું. 30-40 દિવસ પછી રોપાઓ 12-15 સેમી ઊંચા થાય ત્યારે રોપણ કરવું. (સ્રોત: કેરળ કૃષિ વિભાગ અને વિકાસપેડિયા)	**விதைப்பு நேரம்**	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ / ಋತು • ನರ್ಸರಿ ಬಿತ್ತನೆ: ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ (ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ) ಮತ್ತು ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ಖರೀಫ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ). • ಒಳಾಂಗಣ ಬೀಜಗಳು: ನೀರಾವರಿ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ. 30-40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊಳಕೆಗಳು 12-17 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಸಿ ಮಾಡಿ. (ಮೂಲ: ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್‌ಪೆಡಿಯಾ)	**నాటే సమయం**	**விதைப்பு நேரம்**
Seed rate & Spacing	Seed Rate / Sowing Method / Spacing Seed rate: 400 grams/ipm (pollinated) or 100 g/ac (hybrid). Sow in nursery beds (10 m x 1.5 m x 0.15 m height), cover with shade net. Irrigate lightly until germination. Spacing: 60 × 45 cm for irrigated crops; 75 × 60 cm in rainfed conditions. (Source: Kerala Agriculture Dept.)	मिरची बियाणे / पेरणी पद्धत / अंतर बीज दर: 400 ग्रॅम/एकर (पुष्पित परागसिंचन) किंवा 100 ग्रॅम/एकर (संकरित). मुळांसाठी गादीवाफे (1 मीटर रुंदीवर, 15 सेमी उंची) तयार करा, त्यावर सावलीची जाळी आच्छादन करा. उगवेपर्यंत हलके पाणी द्या. अंतर: सिंचनाखालील पिकांसाठी 60 × 45 सेमी; पिकलेली परिस्थितीत 75 × 60 सेमी.	**मुळांचे बियाणे**	બીજ દર / વાવણી પદ્ધતિ / અંતર • બીજ દર: ઓલાદી વિનાનાં બિયારણ (પરાગી વિનાનાં) માટે 400 ગ્રામ/એકર; સંકર બિયારણ માટે 100 ગ્રામ/એકર. • નર્સરી બેડમાં વાવો (1 મીટર પહોળાઈ, 15 સે.મી. ઊંચાઈ) અને તેને છાયા નેટથી ઢાંકો. ઉગાડતા પહેલાં હળવું પાણી આપો. • સિંચાઈ હેઠળના પાક માટે 60 × 45 સે.મી.; વરસાદી પરિસ્થિતિમાં 75 × 60 સે.મી.	**விதை விகிதம் மற்றும் இடைவெளி**	ಬೀಜ ದರ / ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ / ಅಂತರ ಬೀಜ ದರ: 400 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ (ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ) ಅಥವಾ 100 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ (ಹೈಬ್ರಿಡ್). ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ (10 ಮೀ x 1.5 ಮೀ x 0.15 ಮೀ ಎತ್ತರ) ಬಿತ್ತಿ, ನೆರಳು ಬಲೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವವರೆಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅಂತರ: ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 60 × 45 ಸೆಂ.ಮೀ; ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 75 × 60 ಸೆಂ.ಮೀ. (ಮೂಲ: ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ)	**నారు తీసే రకం / విత్తే పద్ధతి / అంతరం** • విత్తన రేటు: 400 గ్రా/ఎకరా (పుష్పించిన పరాగసంపర్కం) లేదా 100 గ్రా/ఎకరా (హైబ్రిడ్). • నర్సరీ పడకలలో విత్తండి (1 మీటర్ వెడల్పు, 15 సెం.మీ. ఎత్తు) మరియు నీడ వలతో కప్పండి. మొలకెత్తే వరకు తేలికగా నీరు పోయండి. • అంతరం: నీటిపారుదల పంటలకు 60 × 45 సెం.మీ.; వర్షాధార పరిస్థితులలో 75 × 60 సెం.మీ.	**விதை மற்றும் நாற்று தயாரிப்பு**
Seed Treatment	Seed Treatment Treat seeds with Trichoderma viride @ 4 g/kg seed or Pseudomonas fluorescens @ 10 g/kg before sowing to prevent fungal diseases. For chemical treatment: Captan or Thiram @ 2 g/kg seed.	बीज उपचार मशरूमी रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूर्वी बियाणे ट्रायकोडर्मा विरिडे (Trichoderma viride) @ 4 ग्रॅम/किलो बियाणे किंवा स्यूडोमोनास फ्लुरोसेन्स (Pseudomonas fluorescens) @ 10 ग्रॅम/किलो बी वापरावे. रासायनिक उपचारासाठी: कॅप्टन (Captan) किंवा थिरम (Thiram) @ 2 ग्रॅम/किलो बी.	**पेरणी पहिल्या**	બીજ સારવાર ફંગલ રોગોથી રક્ષણ કરવા માટે વાવણી પહેલાં બીજને ટ્રાઈકોડર્મા વિરિડે @ 4 ગ્રામ/કિલો બીજ અથવા સ્યૂડોમોનાસ ફ્લોરોસેન્સ @ 10 ગ્રામ/કિલો બી સારવાર કરો. રાસાયણિક સારવારઃ કેપ્ટન અથવા થિરમ @ 2 ગ્રામ/કિલો બીજ.	**விதை சுத்திகரிப்பு**	ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ (Trichoderma viride) @ 4 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ (Pseudomonas fluorescens) @ 10 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ: ಕ್ಯಾপ್ಟನ್ (Captan) ಅಥವಾ ಥಿರಮ್ (Thiram) @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ.	**విత్తన శుద్ధి**	**விதை சுத்திகரிப்பு**
Weed Management	Weed Control First hand weeding at 25-30 days after transplanting and second after 50-55 days. Mulching with plastic or organic residues helps control weeds and conserve moisture. Avoid deep hoeing near roots.	तण नियंत्रण लागवडीनंतर 25-30 दिवसांनी पहिली खुरपणी आणि 50-55 दिवसांनी दुसरी खुरपणी करा. प्लास्टिक किंवा सेंद्रिय अवशेषांचे आच्छादन करणे हे तणनियंत्रणात मदत करते आणि ओलावा टिकवून ठेवते. मुळांच्या जवळ खोलवर कुदळणे टाळावे.	**पेरणीनंतर पहिलीच**	નીંદણ નિયંત્રણ પ્રથમ નીંદણ રોપણ પછી 25-30 દિવસે અને બીજું નીંદણ 50-55 દિવસે કરો. પ્લાસ્ટિક અથવા કાર્બનિક અવશેષોનું મલ્ચિંગ નીંદણને નિયંત્રણ કરવામાં મદદ કરે છે. મૂળની નજીક ઊંડા ખોદકામ ટાળો.	**களை மேலாண்மை**	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಾಟಿ ನಂತರ 25-30 ದಿನಗಳ ಮೊದಲ ಮತ್ತು 50-55 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.	**కలుపు నివారణ**
Fertilizer Management	Fertilizer & Nutrient Management Follow soil test results. General guideline per hectare: • FYM: 20-25 t (basal) • NPK: 160:100:100 kg/ha (N:P:K:K2O) Application schedule: - Full P & K and half N as basal dose before transplanting. - Remaining N in two equal splits — at 30 and 60 days after transplanting. Use Azospirillum and Phosphobacteria @ 2 kg/ha along with organic manure. (Source: Kerala Agriculture & Vikaspedia)	उर्वरक एवं पोषक तत्व प्रबंधन मृदा परीक्षण के आधार पर अनुसरण करें। सामान्य दिशानिर्देश: प्रति हेक्टेयर: • गोबर की खाद: 20-25 टन (आधारभूत) • एनपीके: 160:100:100 किग्रा/हे. (N:P:K:K2O) आवेदन का समय: - रोपाई से पहले पूरी फास्फोरस और पोटाश और आधी नाइट्रोजन आधारभूत खुराक के रूप में दें। - शेष नाइट्रोजन को दो बराबर हिस्सों में — 30 और 60 दिन बाद दें। जैविक खाद के साथ एजोस्पिरिलम और फॉस्फोबैक्टीरिया का प्रयोग 2 किग्रा/हे.किया जाए। (स्रोत: केरल कृषि एवं विकासपेडिया)	**खत आणि पोषक तत्वांचे व्यवस्थापन** माती परीक्षणाच्या खत दरा पाळा. सामान्य मार्गदर्शक सूचना: • शेणखत: 20-25 टन (पायाभूत) • एनपीके: 160:100:100 किलोग्रॅम/हे (एन:पी:के:के2ओ) खत देण्याचे वेळापत्रक: - लागवडीपूर्वी पायाभूत म्हणून संपूर्ण पी आणि के आणि अर्धे एन द्यावे. - उर्वरित एन दोन समान हप्त्यांमध्ये द्या — लागवडीनंतर 30 आणि 60 दिवस. सेंद्रिय खतासोबत अझोस्पिरिलम आणि फॉस्फोबॅक्टीरियाचा वापर 2 किग्रा/हेक्टर करा. (स्रोत: केरळ कृषी आणि विकासपेडिया)	**உரம் மேலாண்மை** உரங்கள் & ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை மண் பரிசோதனை முடிவுகளை பின்பற்றவும். பொதுவான வழிகாட்டுதல்: • எரு: 20-25 டன் (அடிப்படை) • NPK: 160:100:100 கிலோ/ஹெக்டேர் (N:P:O:K2O) அட்டவணை: - நடவுக்கு முன் P & K மொத்தமாக மற்றும் N பாதி அடிப்படை. - மீதமுள்ள N ஐ 30 மற்றும் 60 நாட்களில் இரண்டு சமமான தவணைகளாக பிரித்து இடவும். அசோஸ்பைரில்லம் மற்றும் பாஸ்ஃபோபாக்டீரியாவை 2 கிலோ/ஹெக்டேர் பயன்படுத்தவும். (மூலம்: கேரள கிருஷி மற்றும் விகாஸ்பீடியா)	**ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ** ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಸರಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: • ಎಫ್‌ವೈಎಂ: 20-25 ಟನ್ (ಮೂಲ) • ಎನ್‌ಪಿಕೆ: 160:100:100 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (N:P:K:K2O) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: - ಸಂಪೂರ್ಣ P & K ಮತ್ತು ಅರ್ಧ N ಅನ್ನು ಮೂಲ ಡೋಸ್‌ನಂತೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯಿಸಿ. - ಉಳಿದ N ಅನ್ನು ನಾಟಿ ನಂತರ 30 ಮತ್ತು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಅಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ 2 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿ. (ಮೂಲ: ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್‌ಪೀಡಿಯಾ)	**ఎరువు & పోషక నిర్వహణ** మట్టి పరీక్ష ఆధారంగా పాటించండి. సాధారణ మార్గదర్శకాలు: • ఎరువు: 20-25 టన్నులు (FYM) • NPK: 160:100:100 కిలోగ్రాములు/హెక్టార్ (N:P:O:K2O) వర్తింపు షెడ్యూల్: - నాటడానికి ముందు పూర్తి భాస్వరం (P) & పొటాషియం (K) మరియు సగం నత్రజని (N) మూలకం. - మిగిలిన నత్రజనిని రెండు సమాన వాటాలుగా — నాటిన 30 మరియు 60 రోజుల తర్వాత వర్తించండి. సేంద్రియ ఎరువుతో పాటు అజోస్పిరిల్లమ్ మరియు ఫాస్ఫోబాక్టీరియాను 2 కిలోగ్రాములు/హెక్టార్ వర్తించండి. (మూలం: కేరళ వ్యవసాయ & వికాస్‌పెడియా)	**ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ** ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಸರಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: • ಎಫ್‌ವೈಎಂ: 20-25 ಟನ್ (ಮೂಲ) • ಎನ್‌ಪಿಕೆ: 160:100:100 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (N:P:O:K2O) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: - ಸಂಪೂರ್ಣ P & K ಮತ್ತು ಅರ್ಧ N ಅನ್ನು ಮೂಲ ಡೋಸ್‌ನಂತೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯಿಸಿ. - ಉಳಿದ N ಅನ್ನು ನಾಟಿ ನಂತರ 30 ಮತ್ತು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಅಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ 2 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿ. (ಮೂಲ: ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್‌ಪೀಡಿಯಾ)	**ఎరువు నిర్వహణ**
Irrigation Management	Irrigation Management Maintain uniform soil moisture, avoid water stress and waterlogging. • Immediately after transplanting: light irrigation. • Vegetative to flowering stage: irrigation every 5-6 days in light soils and 7-10 days in heavy soils. • Reduce or stop irrigation during flowering and fruit maturity to prevent fruit rot. Drip irrigation improves yield and water efficiency. (Source: KSHEM Karnataka & Kerala Agriculture)	सिंचाई व्यवस्थापन मिरची ही जमीन तर ठेवत नाही म्हणून सतत पाणी, जास्त तापमान आणि जास्तीचा पाऊस यांपासून सावध राहावे. • रोपांची रुजवण: हलकी सिंचाई. • वाढीच्या टप्प्यापासून फुलोऱ्यापर्यंत: हलक्या जमिनीत दर 5-6 दिवसांनी आणि जड जमिनीत 7-10 दिवसांनी सिंचन करावे. • फुलोरा आणि फळ पक्वतेच्या काळात सिंचन कमी करावे किंवा थांबवावे जेणेकरून फळ कुजणे टाळता येईल. • ठिबक सिंचन उत्पादन आणि पाण्याच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करते. (स्रोत: केएसएचईएम कर्नाटक आणि केरळ कृषी)	**सिंचनाच्या सुरुवातीच्या** सर्वत्र समान जमिनीचा ओलावा राखा, पाणी ताण आणि पाणी साचणे टाळा. • लागवडीनंतर लगेच: हलकी सिंचन. • वनस्पतिवत्त ते फुलोरा: हलक्या जमिनीत दर 5-6 दिवसांनी आणि जड जमिनीत 7-10 दिवसांनी. • फुलोरा आणि फळ पक्वतेच्या काळात सिंचन कमी करा किंवा थांबवा जेणेकरून फळ कुजणे टाळता येईल. ठिबक सिंचन उत्पादन आणि पाण्याच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करते. (स्रोत: केएसएचईएम कर्नाटक आणि केरळ कृषी)	**நீர்ப்பாசன மேலாண்மை** மண்ணில் சீரான ஈரப்பதத்தைப் பராமரிக்கவும். நீர் பற்றாக்குறை மற்றும் நீர் தேக்கத்தைத் தவிர்க்கவும். • நாற்று நட்ட உடனே: இலேசான நீர்ப்பாசனம். • கொடி வளரும் பருவம் முதல் பூக்கும் பருவம் வரை: இலேசான மண்ணில் 5-6 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும், கனமான மண்ணில் 7-10 நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். • பூக்கும் மற்றும் பழங்கள் முதிர்ச்சி அடையும் காலத்தில் நீர்ப்பாசனத்தை குறைக்கவோ அல்லது நிறுத்தவோ வேண்டாம் (~10 நாள்). • சொட்டு நீர்ப்பாசனம் மகசூல் மற்றும் நீர் திறனை மேம்படுத்தும். (மூலம்: கேஎஸ்எச்இஎம் கர்நாடகா & கேரள வேளாண்மை)	**నీటిపారుదల నిర్వహణ** మంచి నేల తేమను నిర్వహించండి, నీటి ఒత్తిడి మరియు నీరు నిలవకుండా నివారించండి. • నాటిన వెంటనే: తేలికపాటి నీటిపారుదల. • వెజిటేటివ్ నుండి పుష్పించే దశ వరకు: తేలికపాటి నేలలో ప్రతి 5-6 రోజులకు మరియు భారీ నేలలో ప్రతి 7-10 రోజులకు. • పుష్పించే మరియు పండు పక్వత దశలో నీటిపారుదలను తగ్గించండి లేదా నిలిపివేయండి. బిందు సేద్యం దిగుబడి మరియు నీటి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. (మూలం: KSHEM కర్ణాటక & కేరళ వ్యవసాయం)	**நீர்ப்பாசன நிர்வாகம்** சீரான மண் ஈரப்பதத்தை பராமரிக்கவும், நீர் அழுத்தம் மற்றும் நீர் தேங்குவதை தவிர்க்கவும். • நாற்று நட்ட உடனே: லேசான நீர்ப்பாசனம். • தாவர நிலை முதல் பூக்கும் வரை: லேசான மண்ணில் ஒவ்வொரு 5-6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, கனமான மண்ணில் ஒவ்வொரு 7-10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. • பூக்கும் மற்றும் பழங்கள் முதிர்ச்சி அடையும் காலத்தில் நீர்ப்பாசனத்தை குறைக்கவோ அல்லது நிறுத்தவோ. சொட்டு நீர்ப்பாசனம் மகசூல் மற்றும் நீர் திறனை மேம்படுத்தும். (மூலம்: KSHEM கர்நாடகா & கேரள விவசாயம்)	**ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ** ಸಮವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. • ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ: ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ. • ಸಸ್ಯಕ ಹಂತದಿಂದ ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದವರೆಗೆ: ಹಗುರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 5-6 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೆ. • ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಪಕ್ವತೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. (ಮೂಲ: KSHEM ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಕೃಷಿ)	**నీటిపారుదల నిర్వహణ** నేల తేమను నిర్వహించండి, నీటి ఒత్తిడి మరియు నీరు నిలవకుండా నివారించండి. • నాటిన వెంటనే: తేలికపాటి నీటిపారుదల. • వృక్షసంబంధ దశ నుండి పుష్పించే దశ వరకు: తేలికపాటి నేలలో ప్రతి 5-6 రోజులకు మరియు భారీ నేలలో ప్రతి 7-10 రోజులకు. • పుష్పించే మరియు పండు పక్వత దశలో నీటిపారుదలను తగ్గించండి లేదా నిలిపివేయండి. బిందు సేద్యం దిగుబడి మరియు నీటి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. (మూలం: KSHEM కర్ణాటక & కేరళ వ్యవసాయం)	**ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ**
Disease Management	Disease Management 1. Damping-off (nursery): Soil drenching with Copper oxychloride 0.25% or Mancozeb 0.25%. 2. Powdery mildew: Spray Hexaconazole 1 ml/L or Sulphur dust @ 20 kg/ha. 3. Fruit rot (Phytophthora): Spray Copper oxychloride 0.3% or Metalaxyl-Mancozeb 0.25% at 10 day intervals. 4. Leaf curl / Mosaic: Control whitefly (vector) using Imidacloprid 0.3 ml/L; remove infected plants. (Source: Agri-Khet & Kerala Agriculture)	रोग व्यवस्थापन 1. रोपवाटिका रोग (डंपिंग ऑफ): जमिनीवर कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 0.25% किंवा मँकोझेब 0.25% ची आळवणी करा. 2. भुरी रोग: हेक्साकोनाझोल 1 मि.ली./लि. किंवा सल्फर धूळ @ 20 किग्रा/हे. फवारणी करा. 3. फळ कुजणे (फायटोफ्थोरा): कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 0.3% किंवा मेटालॅक्सिल-मँकोझेब 0.25% ची फवारणी 10 दिवसांच्या अंतराने करावी. 4. पाने कुरडणे / मोझॅक: पांढऱ्या माशीचे (वाहक) नियंत्रण इमिडाक्लोप्रिड 0