PRACTICES	HYBRIDS WATERMELON (SEAMONS MAHARALI)	ಅಸ್ಸಾಮಿಯಾ	ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಲು (ಕಿಲೋ ಇಳುವರಿ)	ಚೀನಾದಲ್ಲಿ	ಹಿಂದಿ ಸಾಲು (ಕಿಲೋ ಇಳುವರಿ)	ಇಟಲಿ	ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು	ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನತೆ (ಕಿಲೋಗಳು ಇಳುವರಿ)	ಒಡಿಶಾ	ಪಂಜಾಬಿ ಸಾಲು (ಕಿಲೋ ಇಳುವರಿ)	ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್	ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ৰোগ আৰু ৰোগী	ভুট্টাৰ বা পাতৰ বিয়পৰা অৱশেষ, আগাছা, পুৰণি বেল আৰু ৰোগগ্ৰস্ত/ক্ষতিগ্ৰস্ত গছৰ অংশ বপনৰ আগতে আঁতৰাই পেলোৱা। ৰোগ আৰু পোকৰ ৰফা কমাবলৈ ক্ষেত্ৰৰ কাষৰ অংশ পৰিষ্কাৰ ৰাখক।	西瓜种子	फसल के पिछले अवशेष, खरपतवार, पुराने बेलों और रोगग्रस्त/क्षतिग्रस्त पौधों को बुवाई से पहले हटाएँ। कीट और रोगों के प्रसार को कम करने के लिए खेत की सीमाओं को साफ़ रखें।	cocomero	ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಕಳೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.	ಮರಾಠಿ ಭೂಮಿ	ಪೂರ್ವ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು, ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.	ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಿಯಾ
Soil requirement	Sandy loam to loam soils, well-drained, fertile, rich in organic matter. Ideal pH 6.0–7.0. Avoid waterlogging as watermelon roots are shallow and sensitive to excess moisture.	বেলি বাবে মাটি	বালুই দোমট বা দোমট মিহাটী, ভালকৈ নিকাশী কৰা, সাৰবান আৰু কাৰ্বনিক পদাৰ্থেৰে সমৃদ্ধ। আদৰ্শ pH: 6.0–7.0। জলাবদ্ধতা এৰি কাষৰিয়া বালুৰ মাটি বাছা কিয়নো তৰমুজৰ মূল অগভীৰ আৰু বেছি আৰ্দ্ৰতাৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হয়।	西瓜对土壤的要求	5.5से 7.0तक पीएचवाली बलुई दोमट, अच्छी तरह से जल निकासी वाली, उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर। आदर्श pH: 6.0–7.0। पानी भरने से बचें क्योंकि तरबूज की जड़ें उथली होती हैं और अधिक नमी के प्रति संवेदनशील होती हैं।	मराठी भूमिला	ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಮಣ್ಣು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ. ಆದರ್ಶ pH: 6.0–7.0. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದವು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2–3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	মাটি পৰীক্ষণ	EC, pH, OC আৰু মেক্ৰো-মাইক্ৰো পুষ্টিসাৰ পৰীক্ষা কমটো এবাৰ অন্ততঃ 2-3 বছৰ ধৰি এবাৰ কৰা আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ভিত্তিতে সাৰ প্ৰয়োগ কৰা।	土壤检测	EC, pH, OC तथा मैक्रो-माइक्रो पोषक तत्वों के लिए हर 2–3 वर्ष में कम से कम एक बार मृदा परीक्षण करें और परीक्षण परिणामों के आधार पर उर्वरक डालें।	मराठी पोषण	EC, pH, OC आणि मॅक्रो-मायक्रो पोषक तत्वांसाठी दर 2-3 वर्षांपेक्षा कमीतकमी एकदा माती परीक्षण करा आणि परीक्षणाच्या निकालानुसार खतं द्यावा.	ಮರಾಠಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು	EC, pH, OC ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-ಮೈಕ್ರೋ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.	ಸಂಸ್ಕೃತ
Climate Suitability	Watermelon is a warm-season crop. Optimum temperature: 25–35 °C. Avoid frost and high humidity. Dry, hot weather improves fruit sweetness.	বতৰৰ উপযোগিতা	তৰমুজ হল উষ্ণ মৌসুমৰ শস্য। প্ৰকৃষ্ট তাপমাত্ৰাৰ পৰিসৰ: 25-35 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ। হিমা আৰু অধিক আৰ্দ্ৰতাৰ পৰা এৰি থাকক। শুষ্ক আৰু গৰম বতৰে তৰমুজৰ মধুৰতা বঢ়ায়।	气候适宜性	西瓜是一种暖季作物。最适宜的温度为 25-35 °C。避免霜冻和高湿度。干燥、炎热的天气会增加果实的甜度。	मराठी हवामान	तरबूज उष्ण हंगामी पीक आहे. इष्टतम तापमान: 25-35 °C. दंव आणि उच्च आर्द्रता टाळा. कोरडे, उष्ण हवामान फळाचा गोडवा वाढवते.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಋತುವಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟತಮ ತಾಪಮಾನ: 25-35 °C. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಣ, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.	ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳು
Land preparation	Deep ploughing 2–3 times followed by harrowing for fine tilth. Incorporate 8–10 tons FYM or compost per acre. Create ridges/raised beds for better drainage, especially in heavier soils.	ভূমি ৰুইবলৈ	গভীৰ চাষ দুই/তিনি বাৰ কৰি তাৰ পিছত হেৰোৱা দিয়া হয় যাতে মিহি হয়। প্ৰতি একৰত 8-10 টন গোবৰ বা কম্পোষ্ট মিহলাব লাগে। জল নিকাশৰ বাবে ৰিজ বা উঠা বেডৰ সৃষ্টি কৰক, বিশেষকৈ ভাৰী মাটিত।	整地	2-3 次深耕，随后进行耙地以形成细土。每亩施入 8-10 吨有机肥。为改善排水，尤其是在较重的土壤上，请开垄或建高畦。	मराठी शेत	2-3 वेळा नांगरणे आणि मऊ, बारीक माती तयार करण्यासाठी कुळवणे. प्रति एकर 8-10 टन शेणखत किंवा कंपोस्ट मिसळा. विशेषतः जड मातीत चांगल्या निचऱ्यासाठी रिज किंवा उंच वाफे तयार करा.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಣಗಳಾಗಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.	ಸಂಸ್ಕೃತ
Sowing Time	Spring-Summer Crop: Nov-Feb. Off-season: Sept-Oct	বুৱাৰ সময়	বসন্ত-গ্ৰীষ্মকালীন শস্য: নভেম্বৰ-ফেব্ৰুৱাৰী, কম-মৌসুম: সেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ	播种时间	वसंत-गर्मी फसल: नवंबर-फरवरी, ऑफ-सीजन: सितंबर-अक्टूबर	सेमिनारे कब	वसंत-उन्हाळी पीक: नोव्हेंबर-फेब्रुवारी, ऑफ-सीझन: सप्टेंबर-ऑक्टोबर	ಸೀಮಿಯಾ ಡಿ ಪೊಮ	ಪಂಜಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ವಸಂತ-ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ: ನವೆಂಬರ್-ಫೆಬ್ರವರಿ. ಆಫ್-ಸೀಸನ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್.
Seed rate & Spacing	Seed rate: 350–400 grams/acre (open-field). Sowing: In ridges or raised beds, 1.7-2.m deep. Pre-irrigate soil for better germination. Spacing: 2.m × 0.5-0.75 m	বীজ হাৰ আৰু দূৰত্ব	বীজ হাৰ: 350-400 গ্ৰাম/একৰ (মুক্ত মাটিত)। বপনৰ: 1.7-2.মি. গভীৰ ৰিজত বা উঠা বেডত। ভাল অঙ্কুৰণ হবলৈ বপনৰ আগতে মাটিত পানী দিয়া। দূৰত্ব: 2.m × 0.5-0.75 m	种子用量和间距	种子用量：350-400 克/亩（露天种植）。播种：在垄或高畦上，1.7-2.m 深。播种前先浇水以保证良好发芽。间距：2.m × 0.5-0.75 m	मराठी बियाणे	बियाणे दर: 350-400 ग्रॅम/एकर (मोकळ्या शेतात). पेरणी: 1.7-2.m खोलीच्या (वाफ्यात किंवा सरीत). पेरणीपूर्वी चांगल्या उगवणीसाठी जमिनीत पूर्व-सिंचन करा. अंतर: 2.m × 0.5-0.75 m	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬೀಜ ಸಾಂದ್ರತೆ: 350-400 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ (ಮುಕ್ತ ಹೊಲ). ಬಿತ್ತನೆ: 1.7-2.m ಆಳದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಅಂತರ: 2.m × 0.5-0.75 m	ಸಂಸ್ಕೃತ
Seed Treatment	Treat seeds with Carbendazim @ 2 gm/kg seed, can be followed by Trichoderma viride @ 4 gm/kg seed before sowing.	বীজ চিকিৎসা	বুৱাৰ আগে বীজবোৰক কাৰ্বেণ্ডাজিম @ 2 গ্ৰাম/কিলো বীজ কৰা আৰু তাৰপিছত ট্ৰাইকোডাৰ্মা বিৰিডে @ 4 গ্ৰাম/কিলো বীজৰে কৰা কাৰণে বিয়পৰা হব পাৰে।	种子处理	播种前用多菌灵（2 克/千克）对种子进行消毒，随后可以用木霉菌（4 克/千克）进行处理。	मराठी बियाणे	पेरणीपूर्वी बियाणे कार्बेंडाझिम @ 2 ग्रॅम/किलो बियाणे याने प्रक्रिया करावी, त्यानंतर ट्रायकोडर्मा विरिडे @ 4 ग्रॅम/किलो बियाणे वापरावे.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ @ 4 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬಳಸಿ.	ಸಂಸ್ಕೃತ
Weed Management	Maintain weed-free field during first 3–6 weeks. Use shallow hoeing, mulch/leaf operations, or mulching. Tier to three weedings may be required.	আগাছা নিয়ন্ত্ৰণ	পাতলৈ 2-4 সপ্তাহলৈকে ৰোপৰ বাবে আগাছাৰ মুক্ত ৰাখিব লাগিব। হাতেৰে নিকোৱা, মালচ অথবা পাতৰ কাৰ্যকলাপ অথবা মালচিংৰে উপযোগী হব পাৰে। দুই বা তিনি বাৰ নিকোৱা লাগিব পাৰে।	杂草管理	幼苗 3-4 周时应保持无杂草状态。采用浅锄、覆盖物/叶片操作或覆盖物。可能需要进行 2 至 3 次除草。	मराठी तण	पहिले 3-4 आठवडे शेत तणविरहित ठेवावे. उथळ खुरपणी, आच्छादन/पाने काढणे किंवा आच्छादन वापरा. तण काढणे 2-3 वेळा करावे लागू शकते.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಮೊದಲ 3-4 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಿ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕುಂಟೆ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್/ಎಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಸಿ. ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.	ಸಂಸ್ಕೃತ
Fertilizer Management	FYM or Compost: 8-10 tons before sowing. Chemical fertilizers: Urea ~110 kg, SSP ~150 kg, MOP ~40 kg. Apply full P & K + 1/3 N at sowing; remaining N along vine growth and at fruit set. Foliar spray: 19:19:19 + micronutrients @ 2-3 g/L at 30-35 DAS; 0:0:50 + Micronutrients @ 25 and 50 d. at 50 DAS.	সাৰ ব্যৱস্থাপনা	সাৰ আৰু কম্পোষ্ট: বপনৰ আগতে 8-10 টন। ৰাসায়নিক সাৰ: য়ুৰিয়া ~110 কিগ্ৰা, SSP ~150 কিগ্ৰা, MOP ~40 কিগ্ৰা। বপনৰ সময়ত সমগ্ৰ ফস্ফৰাছ আৰু পটাছৰ সকলো আৰু নাইট্ৰোজেনৰ 1/3 প্ৰয়োগ কৰক। বাকী নাইট্ৰোজেন লতাৰ বৃদ্ধি আৰু ফল বান্ধিবলৈ পৰিয়ালৰ সময়ত দিব লাগে। পাতৰ স্প্ৰে: 19:19:19 + ক্ষুদ্ৰ পুষ্টিসাৰসমূহ @ 2-3 গ্ৰাম/লিটাৰ, 30-35 দিনৰ সময়ত 0:0:50 + ক্ষুদ্ৰপুষ্টিসাৰসমূহ @ 25 আৰু 50 দিনৰ সময়ত 50 দিনৰ।	施肥管理	有机肥与堆肥：播种前施用 8-10 吨。化肥：尿素 ~110 公斤，SSP ~150 公斤，MOP ~40 公斤。播种时施用全部磷和钾肥以及 1/3 氮；剩余氮肥在藤蔓生长期和坐果期施用。叶面喷施：19:19:19 + 微量元素，浓度为 2-3 克/升，30-35 天；0:0:50 + 微量元素，浓度为 25 天和 50 天，50 天时。	मराठी खत	शेणखत किंवा कंपोस्ट: पेरणीपूर्वी 8-10 टन. रासायनिक खते: युरिया ~110 किलो, SSP ~150 किलो, MOP ~40 किलो. पेरणीच्या वेळी सर्व फॉस्फरस आणि पोटॅश आणि 1/3 नायट्रोजन द्या; उर्वरित नायट्रोजन वेल वाढ आणि फळ धरताना द्यावे. पर्ण फवारणी: 19:19:19 + सूक्ष्मपोषक द्रव्ये @ 2-3 ग्रॅम/लिटर, 30-35 दिवस; 0:0:50 + सूक्ष्मपोषक द्रव्ये @ 25 आणि 50 दिवस, 50 दिवसांनंतर.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ಟ್: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ 8-10 ಟನ್. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: ಯೂರಿಯಾ ~110 ಕೆಜಿ, SSP ~150 ಕೆಜಿ, MOP ~40 ಕೆಜಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟಾಶ್ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದ 1/3 ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ; ಉಳಿದ ಸಾರಜನಕ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವಾಗ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ: 19:19:19 + ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು @ 2-3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್, 30-35 ದಿನಗಳು; 0:0:50 + ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು @ 25 ಮತ್ತು 50 ದಿನಗಳು, 50 ದಿನಗಳ ನಂತರ.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು
Irrigation Management	Uniform irrigation, avoid water stress and waterlogging. In summer: once a week or more in sandy soils. Reduce/stop irrigation 3–6 days before harvest to improve sweetness.	সিঞ্চাই ব্যৱস্থাপনা	নিয়মীয়া সিঞ্চাই কৰা, পানীৰ বাবে পানী আৰু বানপানীৰ পৰা এৰি থাকক। গ্ৰীষ্মকালে: বলুৱা মাটিত সপ্তাহে একবাৰ বা ততোধিক বাৰ। মিঠা কৰিবলৈ কাটিবলৈ 3-6 দিন আগতে সিঞ্চাই কমাওক বা বন্ধ কৰক।	灌溉	均匀灌溉，避免缺水和积水。夏季：沙质土壤每周一次或更多次。为提高甜度，请减少或停止收割前 3-6 天的灌溉。	मराठी सिंचन	समान सिंचन करा, पाणी साचणे आणि पाणी ताण टाळा. उन्हाळा: वालुकामय जमिनीत आठवड्यातून एकदा किंवा अधिक वेळा. गोडवा सुधारण्यासाठी कापणीच्या 3-6 दिवस आधी सिंचन कमी करा किंवा थांबवा.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಏಕರೂಪದ ನೀರಾವರಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬೇಸಿಗೆ: ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ. ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 3-6 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನೀರಾವರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.	ಸಂಸ್ಕೃತ
Pest Management	Aphids & Thrips: Thamethoxam @ 5 gm/15 L water. Leaf Miner: Abamectin @ 6 ml/15 L. Fruit Fly: Remove infested fruits. Neem oil/cloud extract 10 gm/L water, repeat Malathion + Jaggery solution 5-7 times at 10 day intervals.	কীট ব্যৱস্থাপনা	পাতৰ জুই বিয়: থামেথক্সাম @ 5 গ্ৰাম/15 লিটাৰ পানী; পাতৰ খনিজ: এবামেক্টিন @ 6 মিলিলিটাৰ/15 লিটাৰ; ফল মাকৰি: ক্ষতিগ্ৰস্ত ফলবোৰ আঁতৰাওক। নিমতেল বা মেঘৰ ৰস 10 গ্ৰাম/লিটাৰ পানী; 10 দিনৰ ব্যৱধানত 5-7 বাৰ মেলাথিয়ন + গুড়ৰ দ্ৰৱণ প্ৰয়োগ কৰক।	害虫管理	蚜虫和蓟马：每 15 升水加 5 克噻虫嗪。潜叶蛾：每 15 升加 6 毫升阿维菌素。果蝇：移除受侵害的果实。每 10 天重复 5-7 次，采用 10 克/升的油性乳剂和 10 克/升的云状提取物，以及马拉硫磷 + 糖蜜溶液。	मराठी कीड	मावा आणि थ्रिप्स: थायमेथोक्सम 5 ग्रॅम/15 लिटर पाणी. पानातील पोखरणारी अळी: अबामेक्टिन 6 मिली/15 लिटर. फळ माशी: संक्रमित फळे काढून टाका. कडुलिंब तेल/ढग अर्क 10 ग्रॅम/लिटर पाणी, 10 दिवसांच्या अंतराने 5-7 वेळा मॅलाथिऑन + गूळ द्रावण.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಗಿಡಹೇನು ಮತ್ತು ಥ್ರಿಪ್ಸ್: ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 5 ಗ್ರಾಂ/15 ಲೀಟರ್ ನೀರು. ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವವರು: ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 6 ಮಿಲಿ/15 ಲೀ. ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ: ಸೋಂಕಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ/ಮೋಡ ಸಾರ 10 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ನೀರು, 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 5-7 ಬಾರಿ ಮಲಾಥಿಯಾನ್ + ಬೆಲ್ಲದ ದ್ರಾವಣ.	ಸಂಸ್ಕೃತ
Disease Management	Powdery Mildew: Water-soluble Sulphur 20 gm/15 L, 2-3 sprays at 10-day intervals. Downy Mildew: Mancozeb 60% WP @ 2 g/L. Sudden Wilt: Avoid waterlogging. Trichoderma viride 1 kg + 50 kg FYM, spray systems + combat fungicide when needed.	রোগ ব্যৱস্থাপনা	পাতৰী উদুৰি: জল ৰপ্তানীয় গন্ধক 20 গ্ৰাম/15 লিটাৰ, 10 দিনৰ ব্যৱধানে 2-3 বাৰ। ডাউনি ডিউ: মেনকোজেব 60% ডব্লিউপি @ 2 গ্ৰাম/লিটাৰ। হঠাৎ নিমিৰা: জলাবদ্ধতা এৰি থাকক। ট্ৰাইকোডাৰ্মা ভিৰিডে 1 কিগ্ৰা + 50 কিগ্ৰা গোবৰ, প্ৰয়োগৰ ব্যৱস্থা, প্ৰয়োজনে ফাঙ্গিছাইড প্ৰতিৰোধ কৰক।	病害管理	白粉病：每 15 升水加 20 克可溶性硫，10 天间隔，喷洒 2-3 次。霜霉病：每升水加 2 克代森锰锌 60% 可湿性粉剂。突然萎蔫：避免积水。必要时，将 1 千克木霉菌与 50 千克粪肥混合，喷洒系统，并防治真菌病。	मराठी रोग	भुरी: पाण्यात विरघळणारे गंधक 20 ग्रॅम/15 लिटर, 10 दिवसांच्या अंतराने 2-3 वेळा फवारणी. डाऊनी मिल्ड्यू: मॅनकोझेब 60% WP @ 2 ग्रॅम/लिटर. अचानक मर: पाणी साचू देऊ नका. ट्रायकोडर्मा विरिडे 1 किलो + 50 किलो फळत, फवारणी यंत्रणा, आवश्यकतेनुसार बुरशीनाशक + ट्रायकोडर्मा बुरशीनाशकांची फवारणी करा.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬೂದಿ ರೋಗ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಲ್ಫರ್ 20 ಗ್ರಾಂ/15 ಲೀಟರ್, 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ಸ್ಪ್ರೇಗಳು. ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ: ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 60% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ. ಅಕಾಲಿಕ ಒಣಗುವಿಕೆ: ಜಲಾವೃತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ 1 ಕಿಲೋ + 50 ಕಿಲೋ ಗೊಬ್ಬರ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ.	ಸಂಸ್ಕೃತ
Harvesting & Yield	Half-slip stage (local market) or mature-green stage (long transport). Watermelon gives average 25-28 ton fruits per acre.	কাঢ়া আৰু উৎপাদন	অৰ্ধ-স্লিপ ষ্টেজ (স্থানীয় বজাৰ) বা পাকৰ পৰা সেউজীয়া ষ্টেজ (দীঘলীয়া পৰিবহণ)। তৰমুজ প্ৰতি বিঘাত গড়ে 25-28 টন ফল দিয়া হয়।	收获与产量	半滑期（当地市场）或成熟绿色阶段（长途运输）。每亩西瓜平均产量为 25-28 吨。	मराठी पीक काढणे	अर्ध-स्लिप स्टेज (स्थानिक बाजार) किंवा परिपक्व-हिरवा टप्पा (लांब वाहतूक). तरबूज प्रति एकर सरासरी 25-28 टन फळे देतात.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಅರ್ಧ-ಸ್ಲಿಪ್ ಹಂತ (ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಅಥವಾ ಪಕ್ವ-ಹಸಿರು ಹಂತ (ದೀರ್ಘ ಸಾರಿಗೆ). ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 25-28 ಟನ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.	ಸಂಸ್ಕೃತ
Post-Harvest Management & Storage	Store the fruits in cool place after harvest. Grade by size and quality. Store and transport the fruits under recommended temperature.	কাঢ়া আৰু সংৰক্ষণ	কাঢ়াৰ পাছত ফলবোৰ শীতল ঠাইত ৰাখক। আকাৰ আৰু গুণমানৰ অনুসৰণ কৰি শ্ৰেণীবদ্ধ কৰক। সুপাৰিশ কৰা উষ্ণতাৰ অনুসৰণ কৰি ফলবোৰ সংৰক্ষণ কৰক আৰু পৰিবহণ কৰক।	收后管理	采收后将水果放在阴凉处。按大小和质量分级。按照建议的温度存放和运输水果。	मराठी काढणी नंतर	काढणीनंतर फळे थंड ठिकाणी साठवा. आकार आणि गुणवत्तेनुसार फळांची वर्गवारी करा. फळांची साठवणूक आणि वाहतूक शिफारस केलेल्या तापमानाच्या श्रेणीत करा.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಾಪಮಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಿ.	ಸಂಸ್ಕೃತ
Disclaimer	These recommendations are based on SAU, government agencies, and trial content. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	অস্বীকৰণ	এই সিফাৰিশবোৰ SAU, সৰকাৰী এজেন্সীবোৰ আৰু পৰীক্ষাৰ ভিত্তিতে দিয়া হয়। প্ৰকৃত ফলাফল মাটিৰ প্ৰকাৰ, জলবায়ু, বিভিন্ন জাত আৰু শস্য ব্যৱস্থাপনা অনুসৰিয়া বিভিন্ন হব পাৰে।	免责声明	这些建议基于 SAU、政府机构和试验内容。实际结果可能因土壤类型、气候、品种和作物管理实践而有所不同。	मराठी डिस्क्लेमर	ही शिफारस SAU, सरकारी संस्था आणि चाचणी साहित्यावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष परिणाम मातीचा प्रकार, हवामान, वाण आणि पीक व्यवस्थापन पद्धतींवर अवलंबून बदलू शकतात.	ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸೀಮಿಯಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಸಂಸ್ಕೃತ