PRACTICES	HYBRID WATERMELON (SEAMONS MAHAKAL)	ಅಸ್ಸಾಮಿಯ	ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಲು (ಶಿರೋನಾಮೆ ಸೂಚಕ)	ಬಂಗಾಳಿಯ	ಮರಾಠಿ ಸಾಲು (ಶಿರೋನಾಮೆ ಸೂಚಕ)	ಒರಿಯಾ	ಒರಿಯಾ ಸಾಲು (ಶಿರೋನಾಮೆ ಸೂಚಕ)	ಪಂಜಾಬಿನವರು	ಪಂಜಾಬಿನ ಸಾಲು (ಶಿರೋನಾಮೆ ಸೂಚಕ)	ಸಂಸ್ಕೃತದ	ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಾಲು (ಶಿರೋನಾಮೆ ಸೂಚಕ)	ತಮಿಳು	ತಮಿಳು ಸಾಲು (ಶಿರೋನಾಮೆ ಸೂಚಕ)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ৰোগ বাঢ়ে	কৃষিজাত অৱশেষ, বিশেষকৈ ৰোগগ্ৰস্ত অংশসমূহ, আগৰ পৰা আঁতৰাই পেলাওক। বীজ বপন কৰাৰ আগে ক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰক। ক্ষেত্ৰৰ সীমাবোৰ সদায় পৰিষ্কাৰ ৰাখক।	পিয়েৰে সাৰকাৰ	पागडी चांगले पावसाच्या पावसाळ्यानंतर, गवताळ, तुटलेले वेल आणि रोगग्रस्त/खराब झालेल्या वनस्पती काढून टाका. शेतात आणि रोपांच्या सभोवतालचे स्वच्छ गवत.	ৰোগ বাঢ়ে	ପୂର୍ବ ଫସଲର ଅବଶେଷ, ବିଶେଷ କରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ରୋଗ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମିର ସୀମା ସଫା ରଖନ୍ତୁ।	ਦਲ ਸਮਾਜਕੀ	ਪਿਛਲੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹਿੰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗ-ਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਓ। ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।	ஷி பிரேஷ்டு	முந்தைய பயிரின் எச்சங்கள், குறிப்பாக நோய் பாதித்த பகுதிகளை விதைப்பதற்கு முன் அகற்றவும். பூச்சி மற்றும் நோய் பரவலைக் குறைக்க வயலின் எல்லைகளை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.
Soil requirement	Sandy loam to loam soils, well-drained, fertile; rich in organic matter. Ideal pH: 6.0–7.0. Avoid waterlogging as watermelon roots are shallow and sensitive to excess moisture.	বিজুলি চে ৰামচন্দ্ৰ	বালুকা দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি, ভালো নিকাশী ব্যবস্থা, উর্বর এবং জৈবিক পদার্থে সমৃদ্ধ। আদর্শ pH: ৬.০–৭.০। জলাবদ্ধতা এড়ান কারণ তরমুজের গাছ অগভীর এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতার প্রতি সংবেদনশীল হয়।	পার্থসারথি মুখার্জি	3.रेत्या जोमेवी जोंग चांगला, चांगला पाणीचा निचरा, सुपीक आणि सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध. व्यवस्थित pH: 6.0–7.0. जास्त पाणी टाळा कारण टरबूजाची मुळे उथळ आहेत आणि जास्त ओलाव्याच्या संवेदनशील आहेत.	ମାଟିରେ ଦୋଆଁଶ	ବାଲୁକା ଦୋଆଁଶ ମାଟି, ଭଲ ନିଷ୍କାସନ, ଉର୍ବର; ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରେ ସମୃଦ୍ଧ। ଆଦର୍ଶ pH: ୬.୦–୭.୦। ଜଳାବଦ୍ଧତା ଏଡାନ୍ତୁ କାରଣ ତରମୁଜର ଗଛ ଅଗଭୀର ଅଟେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ସଂବେଦନଶୀଳ ଅଟେ।	ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤਮਦਾਸ	ਰੇਤਲੀ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ, ਉਪਜਾਊ; ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਆਦਰਸ਼ pH: ਪੱਧਰ 6.0–7.0। ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।	ஷி பிரேஷ்டு
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2–3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	ভূমি পৰীক্ষণ	মাটি পরীক্ষা	মাটি পরীক্ষা	EC, pH, OC आणि मॅक्रो-मायक्रो पोषक तत्वांसाठी माती परीक्षण किमान एकदा 2-3 वर्षांनी करा आणि चाचणी निकालांवर आधारित खते लावा.	ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ	EC, pH, OC ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤ�ত੍ਵਾਂ ਲਈ ਹਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਪਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟেস্ট ਨতীজাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাৰ প্ৰয়োগ কৰক।	ஸ்ரீ பிரேஷ்டு
Climate Suitability	Watermelon is a warm-season crop. Optimum temperature: 25–35 °C. Avoid frost and high humidity. Dry, hot weather improves fruit sweetness.	অসমৰ বৃহস্পতি	তরমুজ হল একটি উষ্ণ মৌসুমের ফসল। সর্বোত্তম তাপমাত্রা: ২৫-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হিমপাত এবং উচ্চ আর্দ্রতা এড়ান। শুষ্ক এবং গরম আবহাওয়া তরমুজের মিষ্টতা বাড়ায়।	অর্ঘ্যকমল দেশমুখ	तरबूज हे उष्ण हंगामाचे पीक आहे. आदर्श तापमान: १५-२२°C. दंव आणि उच्च आर्द्रता टाळावी. कोरडवाहू, उष्ण हवामानामुळे फळांचा गोडवा वाढतो.	ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ	ତରମୁଜ ଉଷ୍ଣ ଋତୁର ଫସଲ। ଇଷ୍ଟତମ ତାପମାତ୍ରା: ୨୫–୩୫ °C। ତୁଷାର ଏବଂ ଉচ্চ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଗ ଫଳର ମଧୁରତା ବଢାଏ।	ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
Land preparation	Deep ploughing 2–3 times followed by harrowing for fine tilth. Incorporate 8–10 tons FYM or compost per acre. Create ridges/raised beds for better drainage, especially in heavier soils.	ভূমি তৈ কৰা	গভীর চাষ করুন এবং তারপর সূক্ষ্ম মাটির জন্য হ্যারো দিন। প্রতি একরে ৮-১০ টন পচা সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ করুন। ভারী মাটিতে ভালো নিষ্কাশনের জন্য রিজ বা উঁচু বেড তৈরি করুন।	সৌমেন ডি. সিংহ	2-3 वेळा खोल नांगरणी करा आणि बारीक मिट्टी के लिए हैरोइंग करें। प्रति एकड़ 8-10 टन पचा खाद या कम्पोस्ट मिलाएं। बेहतर जल निकासी के लिए मेड़ें/उठी हुई क्यारियाँ बनाएँ, विशेषकर भारी मिट्टी में।	ଗଭୀର ଚାଷ	ଗଭୀର ଚାଷ ପରେ ହ୍ୟାରୋ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଏକର 8-10 ଟନ ପଚା ସାର ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାନ୍ତୁ। ଭାରୀ ମାଟିରେ ଭଲ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ବେଡ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।	ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
Sowing Time	Spring-Summer Crop: Nov-Feb. Off-season: Sept-Oct	ৰুবুৰু দাস	বসন্ত-গ্রীষ্মকালীন ফসল: নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি, অফ-সীজন: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	নবকুমার ডে	वसंत-उन्हाळी पीक: नोव्हेंबर-फेब्रुवारी, पीक-हंगाम: सप्टेंबर-ऑक्टोबर	ବିଜୁଲି ଦାସ	ବସନ୍ତ-ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଫସଲ: ନଭେମ୍ବର-ଫେବୃୟାରୀ, ଅଫ୍-ସିଜନ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର	ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	ஸ்ரீ கமலம்	வசந்த-கோடை பயிர்: நவம்பர்-பிப்ரவரி. ஆஃப்-சீசன்: செப்டம்பர்-அக்டோபர்.
Seed rate & Spacing	Seed rate: 350–400 grams/acre (open-field). Seeding: In ridges or raised beds, 1.7-2.m deep. Pre-irrigate soil for better germination. Spacing: 2.m × 0.5-0.75 m	ৰোগ বাঢ়ে	বীজ হার: ৩৫০-৪০০ গ্রাম/একর (খোলা জমি)। বপন: রিজ বা উঠানো বেডে, ১.৭-২.মি গভীর। ভালো অঙ্কুরোদ্গমের জন্য মাটি আগে থেকে সেচ দিন। দূরত্ব: ২.মি × ০.৫-০.৭৫ মিটার	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	बियाणे दर: ३५०-४०० ग्रॅम/एकर (मोकळ्या शेतात). पेरणी: वरंबा किंवा उंच वरंबावरंबे, २.१-२.मीटर खोल. उगवण चांगली व्हावी म्हणून माती आधीच ओलावा द्या. अंतर: २ मीटर × ०.५-०.७५ मीटर	ରୋକ ବିଜୁଲି ଚାଷ	ବିହନ ହାର: ୩୫୦-୪୦୦ ଗ୍ରାମ/ଏକର (ଖୋଲା ଜମି)। ବୁଣା: ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଉଠା ବେଡରେ, ୧.୭-୨.ମି ଗଭୀର। ଭଲ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ପାଇଁ ମାଟିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବଧାନ: ୨.ମି × ୦.୫-୦.୭୫ ମିଟର	ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
Seed Treatment	Treat seeds with Carbendazim @ 2 gm/kg seed, can be followed by Trichoderma viride @ 4 gm/kg seed before sowing.	ৰোগ বাঢ়ে	বীজ শোধন করুন কার্বেন্ডাজিম @ ২ গ্রাম/কেজি বীজ অথবা ট্রাইকোডার্মা ভিরিডে @ ৪ গ্রাম/কেজি বীজ বপনের আগে।	নবকুমার ডে	बियाणे प्रक्रिया: कार्बेन्डाझिम @ 2 ग्रॅम/किलो बियाणे आणि त्यानंतर ट्रायकोडर्मा विरिडे @ 4 ग्रॅम/किलो बियाणे वापरावे.	ବିଜୁଲି ଦାସ	ବିହନ ଚିକିତ୍ସା: କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ @ ୨ ଗ୍ରାମ/କିଲୋ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ବିରିଡେ @ ୪ ଗ୍ରାମ/କିଲୋ ବିହନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।	ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
Weed Management	Maintain weed-free field during first 3–6 weeks. Use shallow hoeing, mulch/hand operations, or mulching. Tier to three weedings may be required.	অপৰাজিতা ডেকা	পহলে 3-4 হপ্তাৰ জন্য ক্ষেত্ৰ আগাছামুক্ত ৰাখক। অগভীৰ কোদালি, মালচিং/হাতেৰে কাম, অথবা মালচিং ব্যৱহাৰ কৰক। প্ৰয়োজনে ১-২ বাৰ আগাছা বাছনি কৰিব পাৰে।	নিলয় নারায়ণ	3.पहले 3-4 आठवड़ों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखें। उथली निराई, मल्चिंग/हाथ से काम, या मल्चिंग का उपयोग करें। आवश्यकतानुसार 1-2 बार खरपतवार निकालना पड़ सकता है।	ଆଗାଛ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	ପ୍ରଥମ 3-4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଗାଛ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଅଗଭୀର ଖନନ, ମଲ୍ଚିଂ/ହାତରେ କାମ, ବା ମଲ୍ଚିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ୧-୨ ଥର ଆଗାଛ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।	ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤਮਦਾਸ
Fertilizer Management	FYM or Compost: 8-10 tons before sowing. Chemical fertilizers: Urea ~110 kg, SSP ~150 kg, MOP ~40 kg. Apply full P & K + 1/3 N at sowing; remaining N along vine growth and at fruit set. Foliar spray: 19:19:19 + micronutrients @ 2-3 g/L at 30-35 DAS; 0:0:50 + Boronutrients @ 25 and 50 d. at 50 DAS.	অমিয় কুমাৰ	গোবর বা কম্পোস্ট: বপনের আগে ৮-১০ টন। রাসায়নিক সার: ইউরিয়া ~১১০ কিগ্রা, SSP ~১৫০ কিগ্রা, MOP ~৪০ কিগ্রা। বপনের সময় সমস্ত ফসফরাস ও পটাশ এবং ১/৩ নাইট্রোজেন প্রয়োগ করুন। বাকি নাইট্রোজেন লতা বৃদ্ধি এবং ফল ধরার সময় প্রয়োগ করুন। পাতায় স্প্রে: ১৯:১৯:১৯ + ক্ষুদ্রপুষ্টি @ ২-৩ গ্রাম/লিটার, ৩০-৩৫ দিনের বপনের পর; ০:০:৫০ + বোরনপুষ্টি @ ২৫ এবং ৫০ দিনের পরে।	অমিয় কুমার	ગોબર ખાતર અથવા ખાતર: વાવણી પહેલાં 8-10 ટનનો ઉપયોગ કરો. રાસાયણિક ખાતર: યુરિયા ~110 કિગ્રા, SSP ~150 કિગ્રા, MOP ~40 કિગ્રા. વાવણી સમયે સમગ્ર ફોસ્ફરસ અને પોટાશ અને 1/3 નાઈટ્રોજન નાખો. વેલાના વિકાસ દરમિયાન અને ફળના સેટિંગ સમયે બાકી નાઈટ્રોજન લાગુ કરો. પર્ણસ્પ્રે: 19:19:19 + સૂક્ષ્મ પોષકતત્વો @ 2-3 ગ્રામ/લિટર, 30-35 દિવસના તરબૂચ 0:0:50 + કેલ્શિયમનાઈટ્રેટ @ 25 દિવસે 50 દિવસ.	ગુરુ પ્રસાદસિંહ	ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਜਾਂ ਖਾਦ: ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-10 ਟਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ: ਯੂਰੀਆ ~110 ਕਿਲੋ, SSP ~150 ਕਿਲੋ, MOP ~40 ਕਿਲੋ। ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ 1/3 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਵੇਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫਲ ਸੈਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ: 19:19:19 + ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤ੤ 2-3 ਗ੍ਰਾਮ/ਲਿਟਰ ਵਿਚਕਾਰ 30-35 ਦਿਨ; 0:0:50 + ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ 25 ਅਤੇ 50 ਦਿਨ।	ஸ்ரீ கமலம்
Irrigation Management	Uniform irrigation, avoid water stress and waterlogging. In summer: once a week or more in sandy soils. Reduce/stop irrigation 3–6 days before harvest to improve sweetness.	বিজুলি চাষৰ	নিয়মিত সিঞ্চাই করুন, পানীর অভাব এবং জলাবদ্ধতা এড়ান। গ্রীষ্মে: বালুকাময় মাটিতে সপ্তাহে একবার বা তার বেশি। ফসল কাটার আগে মিষ্টতা বাড়াতে ৩-৬ দিন সিঞ্চাই কমান বা বন্ধ করুন।	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	नियमित सिंचाई करें, पानी की कमी और जलभराव से बचें। गर्मी में: बलुई मिट्टी में हफ्ते में एक बार या अधिक बार। मिठास बढ़ाने के लिए कटाई से 3-6 दिन पहले सिंचाई कम करें या रोक दें।	ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା	ଜଳସେଚନ ସମାନ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଜଳ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳାବଦ୍ଧତା ଏଡାନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ: ବାଲୁକା ମାଟିରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ। ମିଷ୍ଟତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅମଳର 3-6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଞ୍ଚାଇ କମାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।	ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
Pest Management	Aphids & Thrips: Thamethoxam @ 5 gm/15 L water. Leaf Miner: Abamectin @ 6 ml/15 L. Fruit Fly: Remove infested fruits. Neem-based extract 10 gm/L water, repeat Malathion + Jaggery solution 5-7 times at 10 day intervals.	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	পাতাৰ জুৱা বিৰিঙ: থামেথক্সাম @ ৫ গ্ৰাম/১৫ লিটাৰ পানী, পাতাৰ খনিজ: এবামেক্টিন @ ৬ মিলিলিটাৰ/১৫ লিটাৰ। ফল মাছি: সংক্ৰমিত ফলবোৰ আঁতৰাই পেলাওক। নিমভিত্তিক নিষ্কাশন ১০ গ্ৰাম/লিটাৰ পানী, ম্যালাথিন + গুড় দ্ৰৱণ ৫-৭ বাৰ ১০ দিনৰ ব্যৱধানত।	ঋতুৰাজ বিশ্বাস	ચેપગ્રસ્ત ફળ અલગ કરો. ઉપયોગ કરો: થામેથોક્સામ 5 ગ્રામ/15 લિટર પાણી. પાંદડાનો ખાણિયો: એબામેક્ટિન 6 મિલી/15 લિટર. ફળ માખી: સંક્રમિત ફળો દૂર કરો. લીમડા આધારિત અર્ક 10 ગ્રામ/લિટર પાણી, મેલાથિયન + ગોળનું દ્રાવણ 10 દિવસના અંતરાલે 5-7 વખત પુનરાવૃત્તિ કરો.	ஸ்ரீ கமலம்
Disease Management	Powdery Mildew: Water-soluble Sulphur 20 gm/15 L, 2-3 sprays at 10-day intervals. Downy Mildew: Metalaxyl-M% WP @ 2 g/L. Sudden Wilt: Avoid waterlogging. Trichoderma viride 5 kg + 50 kg FYM, spray systems + conidial fungicide when needed.	ঋতুৰাজ বিশ্বাস	পাউডারি মিলডিউ: জল বা পুনঃজলসিক্ত গন্ধকের ২০ গ্রাম/১৫ লিটার, ১০ দিনের ব্যবধানে ২-৩ স্প্রে। ডাউনি মিলডিউ: মেটালাক্সিল-এম% ডব্লিউপি @ ২ গ্রাম/লিটার। হঠাৎ বিকল: জলাবদ্ধতা এড়ান। ট্রাইকোডার্মা বিরিডে ৫ কিগ্রা + ৫০ কিগ্রা এফএম, প্রয়োজনে কনিডিয়াল ছত্রাকনাশক + স্প্রে সিস্টেম।	অর্ঘ্যকমল দেশমুখ	ચૂર્ણ ફૂગ: પાણીમાં ઓગળતું સલ્ફર 20 ગ્રામ/15 લિટર, 10 દિવસના અંતરે 2-3 સ્પ્રેમાં. ડાઉની ફૂગ: મેટાલેક્સિલ-એમ% ડબ્લ્યુપી @ 2 ગ્રામ/લિટર. અચાનક વિલ્ટ: પાણી ભરાવાનું ટાળો. ટ્રાઇકોડર્મા વિરિડે 5 કિગ્રા + 50 કિગ્રા એફએમ, જરૂરિયાત મુજબ કોનિડિયલ ફૂગનાશક + સ્પ્રે સિસ્ટમ.	ઋતુરાજ વિશ્વાસ
Harvesting & Yield	Half-slip stage (local market) or mature-green stage (long transport). Watermelon gives average 25-30 ton fruit per acre.	অৰ্ঘ্যকমল দেশমুখ	আংশিক-স্লিপ (স্থানীয় বাজার) অথবা পরিপক্ক-সবুজ পর্যায়ে তুলুন (দীর্ঘ পরিবহণ)। তরমুজ প্রতি বিঘায় গড়পড়তা ২৫-৩০ টন ফল দেয়।	নবকুমার ডে	आंशिक-स्लिप (स्थानिक बाजार) किंवा परिपक्व-हिरवा (लांब वाहतूक). तरबूज प्रति एकर सरासरी २५-३० टन फळ देतात.	ଆଂଶିକ-ସ୍ଲିପ୍ (ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର) କିମ୍ବା ପରିପକ୍ୱ-ସବୁଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ଲମ୍ବା ପରିବହନ)। ତରମୁଜ ପ୍ରତି ଏକର ଗଡ଼ପଡ଼ତା ୨୫-୩୦ ଟନ ଫଳ ଦିଏ।	ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੇਨਾ	ஆரம்ப-ஸ்லிப் (உள்ளூர் சந்தை) அல்லது முதிர்ச்சி-பச்சை (நீண்ட தூர போக்குவரத்து). தர்பூசணி ஒரு ஏக்கருக்கு சராசரியாக 25-30 டன் பழங்களைத் தருகிறது.
Post-Harvest Management & Storage	Store the fruits in cool place after harvest. Grade by size and quality. Store and transport the fruits under recommended temperature.	অৰ্ঘ্যকমল দেশমুখ	তরমুজ কাটার পর ঠাণ্ডা জায়গায় রাখুন। আকার এবং গুণমানের অনুসারে গ্রেড করুন। সুপারিশকৃত তাপমাত্রার অধীনে ফলগুলি সংরক্ষণ এবং পরিবহণ করুন।	নবকুমার ডে	तरबूजाच्या फळे थंड जागेत साठवा. आकार आणि गुणवत्तेनुसार वर्गवारी करा. शिफारशीनुसार तापमानाच्या अधीन फळांचा साठवणूक आणि वाहतूक करा.	ତରମୁଜ ଫଳକୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆକାର ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଶ୍ରେଣୀ କରନ୍ତୁ। ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ତାପମାତ୍ରାର ଅଧୀନରେ ଫଳଗୁଡିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ କରନ୍ତୁ।	ଅନୁରାଗ_ଅନ୍ତ୍ରି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଦେଶମୁଖ ଅର୍ଘ୍ୟକମଳ ଦେଶମୁଖ	ஆரம்ப-ஸ்லிப் (உள்ளூர் சந்தை) அல்லது முதிர்ச்சி-பச்சை (நீண்ட தூர போக்குவரத்து). தர்பூசணி ஒரு ஏக்கருக்கு சராசரியாக 25-30 டன் பழங்களைத் தருகிறது.
Disclaimer	These recommendations are based on SAU, government agencies, and trial content. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	অৰ্ঘ্যকমল	এই সিফাৰিশবোৰ SAU, সৰকাৰী এজেন্সিসমূহ আৰু পৰীক্ষাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে। প্ৰকৃত ফলাফল মাটিৰ প্ৰকাৰ, জলবায়ু, বিভিন্ন জাত আৰু শস্য ব্যৱস্থাপনা অনুযায়ী বিভিন্ন হব পাৰে।	পার্থসারথি	या शिफारशी एसएयू, सरकारी संस्था आणि चाचणी सामग्रीवर आधारित आहेत. वास्तव परिणाम माती प्रकार, हवामान, विविधता आणि पीक व्यवस्थापन पद्धतींवर अवलंबून बदलू शकतात.	ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡିକ SAU, ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ମାଟି ପ୍ରକାର, ଜଳବାୟୁ, ବିବିଧତା ଏବଂ ଫସଲ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିର ଉପର ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।	ଅନୁରାଗ_ଅନ୍ତ୍ରି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଦେଶମୁଖ ଅର୍ଘ୍ୟକମଳ ଦେଶମୁଖ	இந்த பரிந்துரைகள் சிஏயு, அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் சோதனை உள்ளடக்கம் அடிப்படையிலானவை. உண்மையான முடிவுகள் மண் வகை, காலநிலை, பன்முகத்தன்மை மற்றும் பயிர் மேலாண்மை நடைமுறைகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.