PRACTICES	HYBRID WATERMELON (SEAMONS TIGER)	ಅಲಾಬಾಮ	ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ)	ಅಲಾಸ್ಕಾ	ಅರಿಜೋನಾ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ)	ಅರಿಜೋನಾ	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಸಿಸಾರಿಯಾ ಭಾಗ)	ಕಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ	ಕೊಲೊರಾಡೊ	ಕೊಲೊರಾಡೊ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಸಿಸಾರಿಯಾ ಭಾಗ)	ಕೊಲೊರಾಡೊ (ಸಿಸಾರಿಯಾ ಭಾಗ)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before viewing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಗಳು, ಕಳೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಪೀಡಿತ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Soil requirement	Sandy loam to loam soils, well-drained, fertile, rich in organic matter. Ideal pH: 6.0-7.0. Avoid waterlogging as watermelon roots are shallow and sensitive to excess moisture.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣುಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದಾಗುವ, ಫಲವತ್ತಾದ, ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ. ಆದರ್ಶ pH: 6.0-7.0. ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದವು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Climate Suitability	Watermelon is a warm-season crop. Optimum temperature: 25-35 °C. Avoid frost and high humidity. Dry, hot weather improves fruit sweetness.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಋತುವಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟವಾದ ತಾಪಮಾನ: 25-35 °C. ಹಿಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನವು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿತನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Land preparation	Deep ploughing 2-3 times followed by harrowing for fine tilth. Incorporate 9-10 ton FYM or compost per acre. Create ridge/normal beds for better drainage, especially in heavier soils.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ 2-3 ಬಾರಿ ನಂತರ ಹರಗುವಿಕೆ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಲು. ಎಕರೆಗೆ 9-10 ಟನ್ FYM ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿಗಾಗಿ ರಿಡ್ಜ್/ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರೀ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Sowing Time	Spring-Summer Crop: Nov-Feb. Off-season: Sept-Oct	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ವಸಂತ-ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ: ನವೆಂಬರ್-ಫೆಬ್ರವರಿ. ಆಫ್-ಸೀಸನ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Seed rate & Spacing	Seed rate: 350-400 grams/acre (open field). Seeding: In ridges or raised beds, 1-2 cm deep. Pre-irrigate soil for better germination. Spacing: 2 m × 0.5-0.75 m	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಬೀಜದ ದರ: 350-400 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆ (ತೆರೆದ ಹೊಲ). ಬಿತ್ತನೆ: ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, 1-2 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಣಗಿರುವಾಗ ಮೊದಲೇ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಅಂತರ: 2 ಮೀ × 0.5-0.75 ಮೀ	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Seed Treatment	Treat seeds with Carbendazim @ 2 gm/kg seed, can be followed by Trichoderma viride @ 4 gm/kg seed before sowing.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲು ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ @ 4 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಅನ್ವಯಿಸಿ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Weed Management	Maintain weed-free field during first 3-6 weeks. Use shallow hoeing, mulch/hand operations, or mulching. Two to three weedings may be required.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ 3-6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ-ಮುಕ್ತ ಹೊಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಹೋಯಿಂಗ್, ಮಲ್ಚ್/ಕೈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಸಿ. ಎರಡು ಮೂರು ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Fertilizer Management	FYM or Compost: 8-10 tons before sowing. Chemical fertilizers: Urea ~110 kg, SSP ~155 kg, MOP ~40 kg. Apply full P & K + 1/3 N at sowing; remaining N along vine growth and at fruit set. Foliar spray: 19:19:19 + micronutrients @ 2-3 g/L at 30-35 DAS; 0:0:50 + Micronutrients @ 25 and 50 days.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಎಫ್‌ವೈಎಂ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲು 8-10 ಟನ್. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: ಯೂರಿಯಾ ~110 ಕಿಲೋ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ~155 ಕಿಲೋ, ಎಂಒಪಿ ~40 ಕಿಲೋ. ಪೂರ್ಣ P ಮತ್ತು K + 1/3 ಸಾರಜನಕ ಅನ್ವಯಿಸಿ; ಉಳಿದ ಸಾರಜನಕ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ: 19:19:19 + ಸೂಕ್ಷ್ಮಪೋಷಕಗಳು @ 2-3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ, 30-35 ದಿನಗಳು; 0:0:50 + ಸೂಕ್ಷ್ಮಪೋಷಕಗಳು @ 25 ಮತ್ತು 50 ದಿನಗಳು.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Irrigation Management	Uniform irrigation, avoid water stress and waterlogging. In summer: once a week or more in sandy soils. Reduce/stop irrigation 3-4 days before harvest to improve sweetness.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ನೀರಾವರಿ, ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ: ಮರಳು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ. ಸಿಹಿತನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 3-4 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನೀರಾವರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ/ನಿಲ್ಲಿಸಿ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Pest Management	Aphids & Thrips: Thamethoxam @ 5 gm/10 L water. Leaf Miner: Abamectin @ 6 ml/10 L. Fruit Fly: Remove infested fruits. Worm and blotch control: 10 gm/L water, repeat Malathion + Jaggery solution 5-7 times at 10 day intervals.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಗಿಡಹೇನು ಮತ್ತು ಥ್ರಿಪ್ಸ್: ಥಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ @ 5 ಗ್ರಾಂ/10 ಲೀಟರ್ ನೀರು. ಎಲೆ ಸುರಂಗ: ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 6 ಮಿ.ಲೀ/10 ಲೀ. ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ: ಸೋಂಕಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಹುಳು ಮತ್ತು ಕಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಲೀಟರ್‌ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ, ಮಲಾಥಿಯಾನ್ + ಬೆಲ್ಲದ ದ್ರಾವಣ 5-7 ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Disease Management	Powdery Mildew: Water-soluble Sulphur 20 gm/10 L, 2-3 sprays at 10-day intervals. Downy Mildew: Mancozeb 64% WP @ 2 g/L. Sudden Wilt: Avoid waterlogging. Trichoderma viride 1 kg + 50 kg FYM, spray systems + conduct fungicide when needed.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಿಟ್ಟು: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಲ್ಫರ್ 20 ಗ್ರಾಂ/10 ಲೀಟರ್, 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ಸ್ಪ್ರೇಗಳು. ಡೌನಿ ಹಿಟ್ಟು: ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ. ಅಕಾಲಿಕ ಒಣಗುವಿಕೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ. ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ 1 ಕೆಜಿ + 50 ಕೆಜಿ ಎಫ್‌ವೈಎಂ, ಸ್ಪ್ರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು + ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Harvesting & Yield	Half-slip stage (local market) or mature-green stage (long transport). Watermelon gives average 25-28 ton fruits per acre.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ-ಸ್ಲಿಪ್ ಹಂತ (ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಅಥವಾ ಪಕ್ವ-ಹಸಿರು ಹಂತ (ದೀರ್ಘ ಸಾಗಣೆ). ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸರಾಸರಿ ಎಕರೆಗೆ 25-28 ಟನ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Post-Harvest Management & Storage	Store the fruits in cool place after harvest. Grade by size and quality. Store and transport the fruits under recommended temperature.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೇಣಿ ನೀಡಿ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಿ.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು
Disclaimer	These recommendations are based on SAU, government agencies, and trial content. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ	ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ) ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು SAU, ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ, ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು