PRACTICES	HYJCUCUMBER (STAR GLORY)	ಅಸ್ಸಾಮಿಯಾ	ಬೃಹತಿ ಬೌಲ (ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಲೋರಿ)	ಒಡಿಯಾ	ಪಂಜಾಬಿ ಬಸಂತಿ (ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಲೋರಿ)	ಪುದುಚೆರಿ	ಬೃಹತಿ ಬೌಲ (ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಲೋರಿ)	ಪ್ರಜಾ-ಪ್ರಭಾಪತಿಗಳು	ಅಸ್ಸಾಮಿಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು (ಕೆಂಪು ಪ್ರಭೇದಗಳು)	ಅಸ್ಸಾಮಿಯಾ	ಸಾಲು ಮತ್ತು ಸಾಲಿನ (ಸೆಂ ಮೀ)	ಅಸ್ಸಾಮಿಯಾ	ಕೃಷಿಯ ಸಲಹೆಗಳ (ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಲೋರಿ)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	**ক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ**	ভুমৰুণ ই পাছৰ বিয়পৰি থকা কণ, আগাছা, পুৰণি বেল আৰু ৰোগগ্ৰস্ত/ক্ষতিগ্ৰস্ত গছৰ পাতৰ বাহিৰ কৰা হয়। খেতি আৰু বেলৰ বাহিৰে থকা ক্ষেত্ৰৰ ৰে ক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় যাতে পোকৰ আৰু ৰোগৰ বংশবৃদ্ধি কমাব পৰা যায়।	**ବିଗତରୁ ବଳକା**	ଆଗରୁ ଚାଷର ଅବଶେଷ, ଆଗାଛ, ପୁରୁଣା ବେଲ ଆଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ/କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଉ। ପୋକ ଆଉ ରୋଗ ବିସ୍ତାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଖେତ ଆଉ ଖେତର ସୀମା ସଫା ରଖାଯାଉ।	**ਖੇਤ ਦੀ ਸਫਾਈ**	ਪਿਛਲਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਫ ਰੱਖੋ।	**ক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ**	ক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় যাতে পোকৰ আৰু ৰোগৰ বংশবৃদ্ধি কমাব পৰা যায়।
Soil requirement	Sandy loam to clayey loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.0. Avoid waterlogging, as Cucumber is sensitive to excess moisture.	**মিহি বা মাঝমধ্যম**	বালুই চাঁদোৱা বা চিকনমাটি, ভাল জল নিকাশী ভাল, উৰ্বৰতা আৰু পৰ্যাপ্ত জৈৱিক পদাৰ্থ থকা। আদৰ্শ পীএচ চীমা: প্ৰায়মান 6.0-7.0। প্ৰায়মান ই ভাল, কাৰণ কাকৰীয়ে পীএচ প্ৰতি সংবেদনশীল হোৱা হে।	**ଆଉଁସି ବାଲିଆଳୁ**	ବାଲୁକାମୟ ବିମ୍ବଳମାଟି ଠାରୁ ବିମ୍ବଳମାଟିଳୁଆ ଯାଏଁ, ଭଲ ନିଷ୍କାଶୀ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା, ଉର୍ବର, ଯଥେଷ୍ଟ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଦର୍ଶ pH ପରିସର: ଆନୁମାନିକ 6.0-7.0। ଜଳାବଦ୍ଧତା ଏଡାଇବା, କାରଣ କାକୁଡ଼ି ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରତି ସଂବେଦନଶୀଳ ଅଟେ।	**ਲਸਣ ਦੋਮਟ**	ਚੰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਰੇਤਲੀ ਦੋਮਟ ਤੋਂ ਚਿਕਣੀ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ। ਆਦਰਸ਼ pH ਸੀਮਾ: ਲਗਭਗ 6.0-7.0। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰਾ ਵਧੇਰੇ ਨਮੀ ਪ্রতি ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।	**মাটিৰ প্ৰয়োজন**
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2–3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	**মূল পৰীক্ষণ**	মিহি বা চিকন, জৈৱিক পদাৰ্থ যুক্ত উৰ্বৰ পীএচ মাটিৰ বাবে ভাল জল নিকাশ হোৱা ই 2-3 বছৰ ই পৰ ৰে ৰে মাটি আৰু পৰীক্ষণ পৰিণামৰ আধাৰ পৰ চাৰ কৰা হয়।	**ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ**	EC, pH, OC ଆଉ ମାକ୍ରୋ-ମାଇକ୍ରୋ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରତି 2–3 ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ଆଉ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ।	**ਮਤੀ ਪਰੀਖਣ**	EC, pH, OC ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ 2–3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟੋਘਟ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਪਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਓ।	**মাটি পৰীক্ষণ**
Climate Suitability	Climate / Weather Requirement: Temperature: Optimum 25 – 35 °C. Rainfall: 120-150 mm is suitable for the crop. Sowing temperature: 22-30 °C	**মাতৃগুণীয়ান সঙ্গতি আৱশ্যকতাসমূহ:** তাপমান: 25-35 ডিগ্ৰী সেলিয়াছ (প্ৰংসা) বৰ্ষা: ফচল ই বাবে 120-150 মিলী চ্যুৰুমা হ। বুনাই কৰা তাপমান: 22-30 ডিগ্ৰী সেলিয়াছ।	**ଜଳବାୟୁ ଉପଯୋଗୀତା**	ଜଳବାୟୁ / ପାଣିପାଗ ଆବଶ୍ୟକତା: ତାପମାତ୍ରା: ଶ୍ରେଷ୍ଠ 25 – 35 °C. ବର୍ଷାପାତ: 120-150 ମିଲି ପାଇଁ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବୁଣାଯାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା: 22-30°C	**ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ**	ਜਲਵਾਯੂ/ਮੌਸਮ ਲੋੜਾਂ: ਤਾਪਮਾਨ: ਅਨੁਕੂਲ 25 – 35 °C. ਮੀਂਹ: ਫਸਲ ਲਈ 120-150 ਮਿਲੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 22-30°C	**কাৰ্যকৰিতা সীমাবদ্ধতা**
Land preparation	Land Preparation: Undertake 3–4 ploughings and harrowings to achieve fine tilth. Incorporate well-decomposed FYM (farmyard manure) when preparing the land.	**মাটি সৈ সিধৰী**	মাটি সৈ সিধৰী: ভালদৰে সৈ সিধৰীৰ বাবে 3-4 বাৰ হাল আৰু হেৰিছৰ কৰা। মাটি সৈ সিধৰা কৰাৰ সময়ত ভালদৰে বিঘটিত গোবৰখাদ (FYM) যোগ কৰিবা।	**ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି**	ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚାଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 3-4 ଥର ଲାଙ୍ଗଳ ଆଉ ହାରୋ କରାଯାଉ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ଥିବାବେଳେ ସୁଚାରୁରୂପେ ବିଘଟିତ ଗୋବର ମିଶାଇବା।	**ਜ਼ਿਮੀਂ ਪਛਹੁ**	ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰੀ: ਬਢਿਆ ਮਤੀ ਲਈ 3-4 ਹਲ ਵਾਹੋ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੋ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਹੋਈ ਗੋਬਰ ਖਾਦ (FYM) ਮਿਲਾਓ।	**ভাল মতীয়া কৰা**
Sowing Time	Sowing Time / Season: Sowing is recommended in February-March for early crops. In low-tunnel or protected cultivation, December sowing may be used for early yield.	**বুনাই কৰা সময়**	বুনাই কৰা সময়ৰ/ঋতুৰ: জাৰুৱা ফচলে আগৰে বাবে ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চত বুনাই কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। কম উষ্ণতা বা সংৰক্ষিত কৰ্ষণত, ডিচেম্বৰ বুনাই কৰা হয় আগৰে বুনাই কৰাৰ বাবে।	**ବୁଣା ସମୟ**	ବୁଣା ସମୟ/ଋତୁ: ଆରମ୍ଭ ଫସଲ ପାଇଁ ଫେବୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୁଣିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। କମ ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଷରେ, ଡିସେମ୍ବର ବୁଣାଯାଇ ପାରେ ଆଗରୁ ଫସଲ ପାଇଁ।	**ਬੀਜਣ ਦੇਣਾ**
Seed rate & Spacing	Spacing / Seed Rate / Sowing Method: Spacing: Beds of width 2.5 m, seeds sown at 60 cm spacing between plants on beds. Seed rate: Approx. 1.5 kg per acre. Sowing depth: 2-3 cm.	**ক্ষেত্ৰ বা গাৰ্ছ পুতি**	ব্যৱধান / বীজ হাৰ / বুনাই পদ্ধতি: ব্যৱধান: 2.5 মীটাৰ পহুলাকৃতি বাহনি, বাহনিত গাছ পুতি 60 চেণ্টিমীটাৰ ৰে দূৰী বা ৰীত কৰা হয়। বীজ হাৰ: প্ৰায়মান 1.5 কিলোগ্ৰাম প্ৰতি একৰ। বুনাই গভীৰতা: 2-3 চেণ্টিমীটাৰ।	**ବିହନ ହାର ଆଉ ବ୍ୟବଧାନ**	ବ୍ୟବଧାନ / ବିହନ ହାର / ବୁଣା ପଦ୍ଧତି: ବ୍ୟବଧାନ: 2.5 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥର ବେଡ଼, ବେଡ଼ ଉପରେ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ବିହନ ବୁଣା ହୁଏ। ବିହନ ହାର: ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକର। ବୁଣା ଗଭୀରତା: 2-3 ସେମି।	**ਬੀਜ ਦਰ ਅਤੇ ਅਲਾਂਘ**	ਅਲਾਂਘ / ਬੀਜ ਮਾਤਰਾ / ਬੀਜੀ ਵਿਧਾਨ: ਅਲਾਂਘ: 2.5 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਬੰਨ, ਬੰਨਾਂ ਉਪਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 60 ਸੇ.ਮੀ. ਅਲਾਂਘ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਦਰ: ਲਗਭਗ 1.5 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ। ਬੀਜਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ: 2-3 ਸੇ.ਮੀ.	**বিহন বৈ**
Seed Treatment	Seed Treatment: Treat seeds before sowing (e.g., with suitable chemical such as Captan @ 2 g per kg seed) to protect against seed-borne diseases.	**বীজ প্ৰক্ৰিয়া**	বীজ প্ৰক্ৰিয়া: বীজ বুনিবৰ লগৰে বীজ বাহক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে বীজ বুনিবৰ আগতে কেপ্টান ৰে (প্ৰতি কিলো বীজত 2 গ্ৰাম) জাতীয় ৰাসায়ন দ্বাৰা বীজ প্ৰক্ৰিয়া কৰা হয়।	**ବିହନ ଚିକିତ୍ସା**	ବିହନ ଚିକିତ୍ସା: ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ (ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଉପଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ଯେପରି କପ୍ଟାନ @ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି କିଲୋ ବିହନ ଅନୁଯାୟୀ)	**ਬੀਜ ਇਲਾਜ**
Weed Management	Fertilizer / Nutrient Management: Basal dose per acre: Urea 90 kg, SSP 125 kg, MOP 35 kg (equivalent to N 40 kg, P 20 kg, K 20 kg). Application: At land preparation apply basal; at sow-lay apply one third of nitrogen + full P & K; remaining N at vine growth stage.	**আগবঢ়া সাৰ্বোত্তম**	সাৰোপযোগ্য সাৰ ব্যৱহাৰ: প্ৰতি একৰ আধাৰভূত ব্যৱহাৰ: ইউৰিয়া 90 কিগ্ৰা., ছাল্ফেট 125 কিগ্ৰা., ছাল্ফেট 35 কিগ্ৰা. (এই ব্যৱহাৰে 40 কিগ্ৰা. নাইট্ৰজেন 20 কিগ্ৰা., পটাছিয়াম 20 কিগ্ৰা. ৰ সমতুল্য)। প্ৰয়োগ: জমি সিধৰা কৰাৰ সময়ত আধাৰভূত ব্যৱহাৰ কৰা; ৰোপণৰ সময়ত নাইট্ৰজেনৰ এ তৃতীয়াংশ + পূৰ্ণ P & K; বাকীখিনি নাইট্ৰজেন লতাৰ বৃদ্ধিৰ স্তৰত প্ৰয়োগ কৰা।	**ସାର ପ୍ରୟୋଗ**	ସାର / ଖତ ଯୋଗ ପରିଚାଳନା: ଫସଲ ପ୍ରତି ଆଧାରଭୂତ ମାତ୍ରା: ୟୁରିଆ 90 କିଲୋ, ଏସଏସପି 125 କିଲୋ, MOP 35 କିଲୋ (ଏନ 40 କିଲୋ, P 20 କିଲୋ, K 20 କିଲୋ ସମତୁଲ୍ୟ)। ପ୍ରୟୋଗ: ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଆଧାରଭୂତ ମାତ୍ରା ଦିଅନ୍ତୁ; ବୁଣିବା ସମୟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ + ପୂର୍ଣ୍ଣ P ଏବଂ K ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ; ଲତା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ବାକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।	**ਖਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ**
Fertilizer Management	Weed Control: Use manual hoeing and/or chemical control. Example: Glyphosate @ 1.6 litre per 150 litre water for non-crop weeds.	**প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা**	প্ৰতিৰোধ নিয়ন্ত্ৰণ: হাতৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ (মুচুৰা) আৰু ৰাসায়নিক নিয়ন্ত্ৰণৰ উপযোগ কৰা। উদাহৰণ: গৈৰ-ফচল প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে 150 লিটাৰ পানী প্ৰতি 1.6 লিটাৰ গ্লাইফোছেট ৰে ব্যৱহাৰ কৰা।	**ବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା**	ବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ହାତରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଆମ୍ବିଚିତ୍ରା ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା କରା ଯାଉଛି, ବିଶେଷତଃ ଗୈର-ଫସଲ ବେଶ ପାଇଁ। ଉଦାହରଣ: ଗୈର-ଫସଲ ବେଶ ପାଇଁ 150 ଲିଟର ପାଣିରେ 1.6 ଲିଟର ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ @ 1.6 ଲିଟର ପ୍ରତି 150 ଲିଟର ପାଣି।	**ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ**
Irrigation Management	Irrigation: Frequent irrigation is required in summer; approx. 10-12 irrigations during the crop cycle. First irrigation pre-sowing, then every 2-3 days initially, later every 4-5 days. Drip irrigation is advantageous. Apni Kheti	**সিঞ্চাই ব্যৱস্থাপনা**	সিঞ্চাই: গৰিমাৰ সময়ত সিঞ্চাই কৰা আৱশ্যকতা হোৱাই ই, আৰম্ভ হোৱা ফচল চক্ৰত প্ৰায়মান 10-12 বাৰ সিঞ্চাই। আগৰে সিঞ্চাই বুনিবৰ আগতে সিঞ্চাই কৰা হয়, তাৰ পাছত 2-3 দিনৰ ই, তাৰ পাছত 4-5 দিনৰ ই। ড্ৰিপ সিঞ্চাই লাভদায়ক ই। আপনি খেতি	**সিঞ্চাই ব্যৱস্থাপনা**	সিঞ্চাই: সিঞ্চাইৰ ব্যবস্থা ঋতুৰ সময়ত প্রয়োজন হয়; প্রায় 10-12 সিঞ্চাই ফসল চক্রে। প্রথম সিঞ্চাই বুনিবার পূর্বে, তারপর প্রথমে প্রতি 2-3 দিনে, পরে 4-5 দিনে। ড্রিপ সিঞ্চাই লাভদায়ক। আপনি খেতি	**ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ**
Pest Management	Pest Management Fruit flies, aphids common pests. Neem oil (0.3% commonly recommended) practice crop hygiene.	**কীট ব্যৱস্থাপনা**	কীট ব্যৱস্থাপনা ফল মাছিমাৰি আৰু ৰাহিছত প্ৰায় কীট ই। 3% নীম ৰস তেল প্ৰায়শঃ পৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফচলৰ ৰে ব্যৱস্থাপনা ৰ ব্যৱহাৰ কৰা।	**ପୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା**	ପୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ଫଳମାଛି, ଏଫିଡ୍ ସାଧାରଣ ପୋକ। 3% ନିମ ତେଲ (ସାଧାରଣତଃ ସୁପାରିଶ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫସଲ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।	**ਕੀੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ**	ਕੀੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਲ ਮੱਖੀ, ਐਫਿਡ ਆਮ ਕੀੜੇ ਹਨ। 3% ਨੀਮ ਤੇਲ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਫਸਲ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।	**পোকৰ ব্যৱস্থাপনা**
Disease Management	Disease Management Powdery mildew managed with fungicidal sprays (carbendazim etc.); mosaic and other foliar diseases controlled via appropriate sprays and sanitation.	**ৰোগ ব্যৱস্থাপনা**	ৰোগ ব্যৱস্থাপনা ধুচুৰা ফাংগাছে (কাৰ্বেণ্ডাজিম আদি) হোৱা ফাংগাছ নিয়ন্ত্ৰণ, মোজেক আৰু আন পাতৰ ৰোগ উপযোগ ফাংগাছ আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়।	**ରୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା**	ରୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଫୁଦୀ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ (କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ଇତ୍ୟାଦି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ; ମୋଜାଇକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ରୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ।	**ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ**
Harvesting & Yield	Harvesting / Yield: The crop starts yielding about 45-50 days after sowing. Apni Khati Typically 10-12 pickings are done. Yield: ~33-42 q/Acre.	**আহৰণ আৰু ফলন**	আহৰণ/ফলন: বুনাই কৰাৰ প্ৰায়মান 45-50 দিন পাছত ফচল ই ফলন ধৰিবলৈ ধৰে। আপনি খেতি: প্ৰায়মান ৰে 10-12 বাৰ আহৰণ কৰা হয়। ফলন: প্ৰায়মান 33-42 কিলোগ্ৰাম প্ৰতি একৰ।	**ଅମଳ ଆଉ ଫଳନ**	ଅମଳ / ଫଳନ: ବୁଣିବାର ପ୍ରାୟ ୪୫-୫୦ ଦିନରେ ଫସଲ ଫଳ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆପନି ଖେତି: ସାଧାରଣତଃ ୧୦-୧୨ ଥର ତୋଳା ହୁଏ। ଫଳନ: ପ୍ରାୟ ୩୩-୪୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ/ଏକର।	**ਵਢਾਈ ਅਤੇ ਝਾੜ**
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest & Handling: Harvest fruits when young & green, using sharp tool to avoid damage. Handle carefully, sort grading for market. (Note: detailed post-harvest handling may need to be adapted locally.)	**আহৰণ কৰাৰ পাছত আৰু সঞ্চয়ণ ব্যৱস্থাপনা**	আহৰণ কৰা পাছত আৰু ৰাখিবৰ বাবে ফলৰ ই হয় যে ই চাই, প্ৰতিটি ফলৰ ই ক্ষিতি হোৱাৰ বাবে ধাৰালো অস্ত্ৰৰে আহৰণ কৰা। সাৱধানে কাম কৰা, বজাৰৰ বাবে শ্ৰেণীবিভাগ কৰা। (নোট: আহৰণ ই কাম কৰি নিজস্ব ফলনৰ পৰা ব্যৱস্থাপনাৰ পৰিণামিতাৰ ই অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন হব পাৰে।)	**ଅମଳ ପରେ ପରିଚାଳନା ଆଉ ଗଚ୍ଛିତ**	ଅମଳ ପରେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା: ଫସଲ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେପରି ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ଏବଂ ସବୁଜ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ତୋଳନ୍ତୁ। ସାବଧାନତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ବଜାର ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରନ୍ତୁ। (ନୋଟ: ଅତିରିକ୍ତ ଫସଲ ପରେ ପରିଚାଳନା ସ୍ଥାନୀୟ ଫଳନ ଅନୁସାରେ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।)	**ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ**	ਵਢਾਈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ: ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। (ਨੋਟ: ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।)	**অসমীয়া**
Disclaimer	These recommendations are based on SAUs, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	**অসমীয়া**	এই পৰামৰ্শসমূহ SAUs, ৰাজহুৱা সংস্থা আৰু পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগবঢ়োৱা হয়। প্ৰকৃত ফলাফল মাটিৰ প্ৰকাৰ, জলবায়ু, বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু শস্য ব্যৱস্থাপনাৰ অনুসৰণ কৰি সলনি হব পাৰে।	**ଅସମୀୟା**	ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ SAUs, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ମାଟିର ପ୍ରକାର, ଜଳବାୟୁ, ବିବିଧତା ଆଉ ଫସଲ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।	**ਪੰਜਾਬੀ**	ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ SAUs, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਲਵਾਯੂ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।