PRACTICES	HY.CUCUMBER (SUPER GLORY)											
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundless of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ఖరీఫ్ లో పొలాన్ని	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		తొలి దశ పంటకు	కుప్పకి తొలగా లేదా ప్రధాన పంట కోసిన తరువాత, ప్రధాన పంట తొలి దశలోనుండి(కాండం చివరి నుండి 5 అడుగుల లోపు) పూర్తిగా తొలగించాలి. పొలం పక్కన ఉన్న పంట తొలి కి ప్రధాన తొలి కి మధ్య కనీసం 15 రోజుల తేడా ఉండాలి. పంట తొలి కి ముందే తొలి కి ప్రధాన తొలి కి మధ్య ఎక్కువ తేడా ఉండకూడదు.	నీటిలో కలపాలి	ఎండిన మొక్కలు, పాత తీగలు మరియు వ్యాధి సోకిన మొక్కల భాగాలను పూర్తిగా తొలగించి, పొలం పక్కన ఉన్న పంట తొలి కి ప్రధాన తొలి కి మధ్య ఎక్కువ తేడా లేకుండా చూడండి.	పొలం పరిశుభ్రత	వేప నూనె, పసుపు నీరు, ఆవు మూత్రం, వేప పిండి, ఎరువులు, పశువుల పేడ, వర్మీ కంపోస్ట్, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, పంట అవశేషాలు, పశువుల పేడ, వర్మీ కంపోస్ట్, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, పంట అవశేషాలు	ఎర్రటి తామర పురుగు, పండు ఈగ, ఆకు మచ్చ తెగులు, బూడిద తెగులు, పండు కుళ్ళు తెగులు, వైరస్ తెగుళ్లు, పచ్చ పురుగు, తామర పురుగు, పండు ఈగ, ఆకు మచ్చ తెగులు, బూడిద తెగులు, పండు కుళ్ళు తెగులు, వైరస్ తెగుళ్లు, పచ్చ పురుగు, తామర పురుగు	ఎర్రటి తామర పురుగు, పండు ఈగ, ఆకు మచ్చ తెగులు, బూడిద తెగులు, పండు కుళ్ళు తెగులు, వైరస్ తెగుళ్లు, పచ్చ పురుగు, తామర పురుగు
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.0. Avoid waterlogging, as Cucumber is sensitive to excess moisture.	విత్తే లోపు	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		విత్తే లోపు	కుప్పకి తొలగా లేదా ప్రధాన పంట కోసిన తరువాత, ప్రధాన పంట తొలి దశలోనుండి(కాండం చివరి నుండి 5 అడుగుల లోపు) పూర్తిగా తొలగించాలి. పొలం పక్కన ఉన్న పంట తొలి కి ప్రధాన తొలి కి మధ్య కనీసం 15 రోజుల తేడా ఉండాలి. పంట తొలి కి ముందే తొలి కి ప్రధాన తొలి కి మధ్య ఎక్కువ తేడా ఉండకూడదు.	నీటిలో కలపాలి	ఎండిన మొక్కలు, పాత తీగలు మరియు వ్యాధి సోకిన మొక్కల భాగాలను పూర్తిగా తొలగించి, పొలం పక్కన ఉన్న పంట తొలి కి ప్రధాన తొలి కి మధ్య ఎక్కువ తేడా లేకుండా చూడండి.	పొలం పరిశుభ్రత	వేప నూనె, పసుపు నీరు, ఆవు మూత్రం, వేప పిండి, ఎరువులు, పశువుల పేడ, వర్మీ కంపోస్ట్, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, పంట అవశేషాలు, పశువుల పేడ, వర్మీ కంపోస్ట్, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, పంట అవశేషాలు	ఎర్రటి తామర పురుగు, పండు ఈగ, ఆకు మచ్చ తెగులు, బూడిద తెగులు, పండు కుళ్ళు తెగులు, వైరస్ తెగుళ్లు, పచ్చ పురుగు, తామర పురుగు, పండు ఈగ, ఆకు మచ్చ తెగులు, బూడిద తెగులు, పండు కుళ్ళు తెగులు, వైరస్ తెగుళ్లు, పచ్చ పురుగు, తామర పురుగు
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	పూర్వ పరీక్షణ	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		విత్తే లోపు	కుప్పకి తొలగా లేదా ప్రధాన పంట కోసిన తరువాత, ప్రధాన పంట తొలి దశలోనుండి(కాండం చివరి నుండి 5 అడుగుల లోపు) పూర్తిగా తొలగించాలి. పొలం పక్కన ఉన్న పంట తొలి కి ప్రధాన తొలి కి మధ్య కనీసం 15 రోజుల తేడా ఉండాలి. పంట తొలి కి ముందే తొలి కి ప్రధాన తొలి కి మధ్య ఎక్కువ తేడా లేకుండా చూడండి.	నీటిలో కలపాలి	ఎండిన మొక్కలు, పాత తీగలు మరియు వ్యాధి సోకిన మొక్కల భాగాలను పూర్తిగా తొలగించి, పొలం పక్కన ఉన్న పంట తొలి కి ప్రధాన తొలి కి మధ్య ఎక్కువ తేడా లేకుండా చూడండి.	పొలం పరిశుభ్రత	వేప నూనె, పసుపు నీరు, ఆవు మూత్రం, వేప పిండి, ఎరువులు, పశువుల పేడ, వర్మీ కంపోస్ట్, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, పంట అవశేషాలు, పశువుల పేడ, వర్మీ కంపోస్ట్, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, పంట అవశేషాలు	ఎర్రటి తామర పురుగు, పండు ఈగ, ఆకు మచ్చ తెగులు, బూడిద తెగులు, పండు కుళ్ళు తెగులు, వైరస్ తెగుళ్లు, పచ్చ పురుగు, తామర పురుగు, పండు ఈగ, ఆకు మచ్చ తెగులు, బూడిద తెగులు, పండు కుళ్ళు తెగులు, వైరస్ తెగుళ్లు, పచ్చ పురుగు, తామర పురుగు
Climate Suitability	Climate / Weather Requirement: Temperature: Optimum 25 – 35 °C. Rainfall: 120-150 mm is suitable for the crop. Sowing temperature: 22-30 °C	పూర్వపు వాతావరణం	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		విత్తే లోపు	అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఆచరించాలి. వాతావరణ: 25-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ (ఉత్తమం) వర్షం: పంటకు కేవలం 120-150 మిలీ వర్షపాతం సరిపోతుంది. కుప్పకి తొలగా వాతావరణ: 22-30 డిగ్రీల సెల్సియస్	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Land preparation	Land Preparation: Undertake 3-4 ploughings and harrowings to achieve fine tilth. Incorporate well-decomposed FYM (farmyard manure) when preparing the land.	భూమి తయారీ	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		భూమి తయారీ	భూమి తయారీ కొరకు మొదటి దశలో 3-4 సార్లు దుక్కి మరియు తోలడం జరుపుట వలన భూమి మెత్తగా అవుతుంది. పశువుల పేడ లేదా కంపోస్ట్ ఎరువు వేసి భూమి తయారు చేయాలి.	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Sowing Time	Sowing Time / Season: Sowing is recommended in February-March for early crops. In low-tunnel or protected cultivation, December sowing may be used for early yield.	కుప్పకి తొలగా	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		కుప్పకి తొలగా సమయము	కుప్పకి తొలగా సమయము కొరకు పంటకి ఫిబ్రవరి-మార్చి నెలలో విత్తనాలు నాటుట మంచిది. తక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన ప్రదేశాలలో డిసెంబర్ నెలలో విత్తనాలు నాటుట వలన త్వరగా దిగుబడి వస్తుంది.	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Seed rate & Spacing	Spacing / Seed Rate / Sowing Method: Spacing: Beds of width 2.5 m; seeds sown at 60 cm spacing between plants on beds. Seed rate: Approx. 1.0 kg per acre. Sowing depth: 2-3 cm.	విత్తే లోపు వరుస పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		విత్తే లోపు వరుస పద్ధతి	కుప్పకి తొలగా సమయము కొరకు వరుసల మధ్య 2.5 మీటర్ వెడల్పుతో మడులు తయారు చేసి మడుల పై భాగాన మొక్కల మధ్య 60 సెంటీమీటర్ తేడా వచ్చే విధంగా విత్తనాలు నాటాలి. విత్తన రకం: సుమారు 1.0 కిలోలు ఎకరానికి. విత్తే లోతు: 2-3 సెంటీమీటర్ లోతు.	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Seed Treatment	Seed Treatment: Treat seeds before sowing (e.g., with suitable chemical such as Captan @ 2 g per kg seed) to protect against seed-borne diseases.	విత్తే లోపు	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		విత్తే లోపు	విత్తన సంరక్షణ: విత్తనాలు విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 2 గ్రాముల చొప్పున కాప్టాన్ లేదా అలాంటి ఇతర తగిన రసాయనాలతో విత్తన శుద్ధి చేయాలి.	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Weed Management	Fertilizer / Nutrient Management: Basal dose per acre: Urea 90 kg, SSP 125 kg, MOP 35 kg (equivalent to N: 40 kg, P 20 kg, K 20 kg). Application: At land preparation apply basal; at sowing apply one third of nitrogen + full P & K; remaining N at vine growth stage.	కలుపు నివారణ	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		పంట తొలి దశలో	ఎరువులు: పశువుల పేడ లేదా వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువు వేసి, పంట తొలి దశలో నత్రజని ఎరువు వేయాలి. పంట పెరుగుదల దశలో నత్రజని ఎరువు వేయాలి.	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Fertilizer Management	Weed Control: Use manual hoeing and/or chemical control. Example: Glyphosate @ 1.6 litre per 150 litre water for non-crop weeds.	పంట తొలి దశలో	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		పంట తొలి దశలో	అవసరాన్ని బట్టి కలుపు తీయడం లేదా రసాయనిక నివారణ చేపట్టాలి. ఉదాహరణకు: పంట లేని చోట లీటర్ నీటికి 1.6 లీటర్ గ్లైఫోసేట్ వాడాలి.	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Irrigation Management	Irrigation: Frequent irrigation is required in summer; approx. 10-12 irrigations during the crop cycle. First irrigation pre-sowing, then every 2-3 days initially, later every 4-5 days. Drip irrigation is advantageous. Apni Khati	విత్తే లోపు నీటి తడి	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		విత్తే లోపు	విత్తే లోపు నీటి తడి అవసరం 10-12 తడి విత్తుకోవాలి. పంట కాలం లో దీర్ఘకాలం 10-12 తడి విత్తుకోవాలి. పంట విత్తే ముందు మొదటి తడి, తరువాత తొలి రోజుల్లో ప్రతి 2-3 రోజులకి, తరువాత ప్రతి 4-5 రోజులకి. బిందు సేద్యం వలన ప్రయోజనం కలదు. అపని ఖేతీ	బిందు సేద్యం	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Pest Management	Pest Management Fruit fly, aphids common pests. Neem oil @3% commonly recommended; practice crop hygiene.	పంట పరిశుభ్రత	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		పంట పరిశుభ్రత	పంట పరిశుభ్రత: పండ్ల ఈగలు, పేనుబంకలు సాధారణ సమస్యలు. వేప నూనె 3% వాడడం సిఫారసు చేయబడింది; పంట పరిశుభ్రత పాటించాలి.	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Disease Management	Disease Management Powdery mildew managed with fungicidal sprays (carbendazim etc.); mosaic and other foliar diseases controlled via appropriate sprays and sanitation.	పంట పరిశుభ్రత	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		పంట పరిశుభ్రత	పంట పరిశుభ్రత: బూడిద తెగులు (కార్బెండజిమ్ వంటి) శిలీంధ్రనాశకాలతో నియంత్రణ జరుగుతుంది. మొజాయిక్ మరియు ఇతర ఆకు మచ్చ తెగుళ్లు తగిన పిచికారీ మరియు పారిశుద్ధ్య చర్యల ద్వారా నియంత్రణ జరుగుతుంది.	పంట పరిశుభ్రత	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Harvesting / Yield	Harvesting / Yield: The crop starts yielding about 45-50 days after sowing. Apni Khati Typically 10-12 pickings are done. Yield: ~33-42 q/acre.	కుప్పకి తొలగా	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		కుప్పకి తొలగా సమయము	కుప్పకి తొలగా సమయము కొరకు పంట విత్తిన తరువాత 45-50 రోజుల పంట పై దశలో ఆరంభమవుతుంది. అపని ఖేతీ పద్ధతిలో 10-12 తడవ తుంపర్లు జరుపుట జరుగుతుంది. దిగుబడి: సుమారు ~33-42 క్వింటాళ్లు/ఎకరం.	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest & Handling: Harvest fruits when young & green, using sharp tool to avoid damage. Handle carefully, sort/grading for market. (Note: detailed post-harvest handling may need to be adapted locally.)	కుప్పకి తొలగా తరువాత పండ్ల నిల్వ మరియు నిర్వహణ	కుప్పకి తొలగా	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		కుప్పకి తొలగా సమయము	కుప్పకి తొలగా సమయము కొరకు పండ్లు పచ్చగా ఉన్నప్పుడు, పదునైన పరికరం వాడి దెబ్బలు తగలకుండా కోయాలి. మార్కెట్ కొరకు పండ్లను జాగ్రత్తగా నిర్వహించి, వర్గీకరణ చేయాలి. (గమనిక: పంట తొలి తరువాత నిర్వహణ స్థానికంగా అనుకూలించేలా మార్చుకోవాలి.)	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
Disclaimer	These recommendations are based on SAUs, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	పరిశీలన	ప్రతిరోజు పొలం	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)
		పరిశీలన	ఈ సిఫారసులన్నీ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు మరియు ట్రయల్ కేంద్రాల ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. వాస్తవ ఫలితాలు నేల రకం, వాతావరణం, రకం మరియు పంట నిర్వహణ పద్ధతుల పై ఆధారపడి మారవచ్చు.	ఆచరణలో	ఎంతమేర జరగాలి (ఫుల్ గ్లోరీ)	పద్ధతి	ప్రతిరోజు పొలం (ఫుల్ గ్లోరీ)	ప్రణాళికలు	ఆచరించాల్సిన ప్రత్యామ్నాయాలు (ప్రస్తుత పరిష్కారాలు)	ఆచార్యులు	పంట నమోదు (కాలపు స్థితి)	శుద్ధిగా ఉంచడం (కలుపు స్థితి)