PRACTICES	HYJ.CUCUMBER (TOP GLORY)												
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundless of field clean to reduce pest and disease carry-over.	**ఛేద దీ ఉంచండి**	కుబ్జ లేదా కొత్త పంటలు నాటడం కంటే ముందు, పురాతన తీగలు మరియు దెబ్బతిన్నవారి మొక్క పదార్థం. పొలం అంచులను శుభ్రంగా ఉంచండి మరియు తెగుళ్ళ మరియు వ్యాధుల మనుగడను తగ్గించడానికి.	**पिछली फसलें**	ఆగస్టు చివర నుండి పరిపక్వ పండ్లను సంగ్రహించి, తీగను, పూలని తొలగించి పొలాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచండి. పురాతన మరియు వ్యాధి సోకిన మొక్కల శిధిలాలను తొలగించండి.	**पौधे स्वच्छता**	పొలం నుండి పాత పంటలు, కలుపు మొక్కలు, పాత తీగలు మరియు వ్యాధి సోకిన మొక్కల శిధిలాలను తొలగించండి. పొలం అంచులను శుభ్రంగా ఉంచండి మరియు తెగుళ్ళ మరియు వ్యాధి మనుగడను తగ్గించడానికి.	**ఖేత స్వచ్ఛత**	పిఛలా ఫసల్ కే అవశేషోం కో హటాయే. ఖేతోం, పురానీ బేలోం మరియు రోగగ్రస్త/క్షతిగ్రస్త పౌధే కే పదార్థ కో బోనే సే పహలే హటాయే. కీట మరియు రోగ కే ప్రసార కో కమ్ కరనే కే లియే ఖేత కీ సీమాఓం కో సాఫ్ రఖేం.
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.0. Avoid waterlogging, as Cucumber is sensitive to excess moisture.	**నేల దీ అవసరాలు**	కుబ్జ లోమ్ కి దోమట్ నేల, బాగా పారే నేల, సారవంతమైన, మంచి సేంద్రియ పదార్థంతో. ఆదర్శ pH పరిధి: సుమారు 6.0-7.0. నీటి నిల్వను నివారించండి, ఎందుకంటే దోసకాయ అధిక తేమకు సున్నితంగా ఉంటుంది.	**मिट्टी की आवश्यकता**	రేతుడ్ దోమట్ లేదా లోమ్, బాగా నీరు పారే, సారవంతమైన, మంచి సేంద్రియ పదార్థంతో. ఆదర్శ pH పరిధి: సుమారు 6.0-7.0. నీటి నిల్వను నివారించండి, ఎందుకంటే దోసకాయ అధిక తేమకు సున్నితంగా ఉంటుంది.	**माटीची आवश्यकता**	వదులుగా నిలకలుండే నీ నిలకలుండేతూన మరియు, సరిగా నిలకల లేనంటి, సుపోష, మరియు సారవంతం కలిగిన లోమంటి నేల. ఆదర్శ pH-శ్రేణి: సుమారు 6.0-7.0. నీరు నిలకలుండకుండా నివారించండి, ఎందుకంటే దోసకాయ అధిక తేమకు సున్నితంగా ఉంటుంది.	**ఆదర్శ నేల**	ఇసుక లోమ్ నేల, బాగా నీరు పారే, సారవంతమైన, మంచి సేంద్రియ పదార్థంతో. ఆదర్శ pH పరిధి: సుమారు 6.0-7.0. నీరు నిలవకుండా నివారించండి, ఎందుకంటే దోసకాయ అధిక తేమకు సున్నితంగా ఉంటుంది.
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	**భూ పరీక్షణ**	మట్టి లేదా నీరు, ఎరువులు లేదా పురుగుమందులు వేయడం కంటే ముందు ఎల్లప్పుడూ పరీక్షించండి. పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా మీ పంటకు అవసరమైన ఎరువులు మరియు పురుగుమందుల పరిమాణాన్ని లెక్కించండి.	**मट्टी परीक्षण**	EC, pH, OC మరియు మాక్రో-మైక్రో పోషకాలకు కనీసం ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మట్టి పరీక్షను నిర్వహించండి మరియు పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా ఎరువులు వేయండి.	**माटी परीक्षण**	EC, pH, OC మరియు స్థూల-సూక్ష్మ పోషకాలకు కనీసం ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మట్టి పరీక్షను నిర్వహించండి మరియు పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా ఎరువులు వేయండి.	**मातीचा प्रकार**	EC, pH, OC आणि मॅक्रो-मायक्रो पोषक द्रव्यांसाठी किमान प्रत्येक 2-3 वर्षांनी एकदा माती परीक्षण करा आणि चाचणीच्या निकालांवर आधारित खते लागू करा.
Climate Suitability	Climate / Weather Requirement: Temperature: Optimum 25 – 35 °C. Rainfall: 120-150 mm is suitable for the crop. Sowing temperature: 22-30 °C	**వాతావరణ అనుకూలత**	వాతావరణం / వాతావరణ అవసరాలు: ఉష్ణోగ్రత: సరైనది 25 - 35 °C. వర్షపాతం: 120-150 మిమీ పంటకు అనుకూలం. విత్తే ఉష్ణోగ్రత: 22-30 °C	**जलवायू अनुकूलता**	हवामान/ वातावरण आवश्यकता: तापमान: आदर्श २५ – ३५°C. पाऊस: पिकासाठी १२०-१५० मिमी पाऊस योग्य आहे. पेरणीसाठी तापमान: २२-३०°C.	**వాతావరణ అవసరాలు**	వాతావరణ / వాతావరణ అవసరాలు: ఉష్ణోగ్రత: 25 – 35 °C. వర్షపాతం: 120-150 మి.మీ. అనువైనది. విత్తే ఉష్ణోగ్రత: 22-30 °C	**योग्यतेचा प्रकार**	हवामान/ वातावरण आवश्यकता: तापमान: आदर्श २५ – ३५°C. पाऊस: पिकासाठी १२०-१५० मि.मी. अनुकूल. पेरणीसाठी तापमान: २२-३०°C.
Land preparation	Land Preparation: Undertake 3-4 ploughings and harrowings to achieve fine tilth. Incorporate well-decomposed FYM (farmyard manure) when preparing the land.	**భూమి తయారీ**	భూమిని దున్నండి: ప్రతిసారి దున్నే ముందు మునుపటి పంట అవశేషాలను తొలగించండి. 3-4 దున్నడం మరియు హారోయింగ్ తర్వాత, సూక్ష్మ మరియు స్థూల పోషకాలతో సమతుల్య మట్టిని సిద్ధం చేయండి.	**मशागत तयारी**	जमिनीची तयारी: जमीन मुरगळून टोपणाखाली ३-४ वेळा नांगरणी आणि कुळवणी करा. जमीन तयार करताना पांगलेले कुजलेले शेणखत जमिनीत मिसळा.	**భూమి తయారీ**	భూమి తయారీ: జాగ్రత్తగా దున్నడం మరియు హారోయింగ్ తర్వాత మట్టిని సిద్ధం చేయండి. దున్నేటప్పుడు బాగా కుళ్ళిపోయిన ఎఫ్‌వైఎం (పశువుల ఎరువు) జోడించండి.	**जमीन तयार करणे**	जमीन तयार करताना: जमीन मुरगळून टोपणाखाली ३-४ वेळा नांगरणी आणि कुळवणी करा. जमीन तयार करताना पांगलेले कुजलेले शेणखत जमिनीत मिसळा.
Sowing Time	Sowing Time / Season: Sowing is recommended in February-March for early crops. In low-tunnel or protected cultivation, December sowing may be used for early yield.	**విత్తే సమయం**	కుబ్జను ఎప్పుడు నాటాలి / సీజన్: ముందస్తు పంటల కోసం ఫిబ్రవరి-మార్చిలో విత్తనం నాటడం సిఫార్సు చేయబడింది. తక్కువ సొరంగం లేదా రక్షిత సాగులో, డిసెంబర్ నాటడం ముందస్తు దిగుబడి కోసం ఉపయోగించబడవచ్చు.	**पेरणीचे वेळ**	पेरणीची वेळ / हंगाम: लवकर पीकांच्या पेरणीसाठी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पेरणी करण्याची शिफारस केली जाते. कमी उष्णता बोगद्यामध्ये किंवा संरक्षित लागवडीमध्ये, डिसेंबर उत्पादनाच्या पेरणीचा वापर लवकर उत्पादनासाठी केला जाऊ शकतो.	**విత్తనాల రేటు**	విత్తే సమయం / కాలం: దోసకాయ లవకారం పెరుగుదలకు ఫిబ్రవరి-మార్చిలో విత్తనం నాటడం సిఫార్సు చేయబడింది. తక్కువ సొరంగం లేదా రక్షిత సాగులో, డిసెంబర్ నాటడం ముందస్తు దిగుబడి కోసం ఉపయోగించబడవచ్చు.	**पेरणीचे वेळ**	पेरणीचे वेळ / हंगाम: कुकुंबर पीकाच्या पेरणीसाठी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात पेरणी करणे शिफारस केली जाते. कमी उष्णता बोगद्यामध्ये किंवा संरक्षित लागवडीमध्ये, डिसेंबर उत्पादनाच्या पेरणीचा वापर लवकर उत्पादनासाठी केला जाऊ शकतो.
Seed rate & Spacing	Spacing / Seed Rate / Sowing Method: Spacing: Beds of width 2.5 m; seeds sown at 60 cm spacing between plants on beds. Seed rate: Approx. 1.0 kg per acre. Sowing depth: 2-3 cm.	**విత్తన రేటు మరియు అంతరం**	అంతరం / విత్తన రేటు / విత్తనాల పద్ధతి: అంతరం: 2.5 మీటర్ వెడల్పుతో బెడ్‌లు; బెడ్‌లపై మొక్కల మధ్య 60 సెం.మీ. అంతరంతో విత్తనాలు విత్తారు. విత్తన రేటు: ఎకరానికి సుమారు 1.0 కిలోలు. విత్తే లోతు: 2-3 సెం.మీ.	**बियाणे दर आणि अंतर**	अंतर / बियाणे दर / पेरणी पद्धत: अंतर: २.५ मीटर रुंदीचे बेडवर, बियाणे बेडवर रोपांमध्ये ६० सेमी अंतराने विणले गेले. बियाणे दर: अंदाजे १.० किलो प्रति एकर.	**బీజ రేటు & అంతరం**	బీజ రేటు / అంతరం: ఎకరానికి కిలో 1.0 వద్ద.	**बीज दर आणि अंतर**	पेरणीची खोली: 2-3 सेमी.
Seed Treatment	Seed Treatment: Treat seeds before sowing (e.g., with suitable chemical such as Captan @ 2 g per kg seed) to protect against seed-borne diseases.	**విత్తన చికిత్స**	విత్తే ముందు విత్తనాలకు చికిత్స చేయండి (ఉదా., కాప్టాన్ వంటి సరైన రసాయనంతో కిలో విత్తనానికి 2 గ్రా) విత్తన సంబంధిత వ్యాధుల నుండి రక్షించడానికి.	**बीज प्रक्रिया**	बीज प्रक्रिया: बियाणांद्वारे पसरणाऱ्या रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूर्वी बियाणांवर प्रक्रिया करा (उदा., कॅप्टनसारख्या योग्य रसायनाने @ २ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे).	**విత్తన శుద్ధి**	విత్తన శుద్ధి: విత్తనాలను విత్తే ముందు (ఉదా., కాప్టాన్ వంటి తగిన రసాయనంతో కిలో విత్తనానికి 2 గ్రా) విత్తన సంబంధిత వ్యాధుల నుండి రక్షించడానికి చికిత్స చేయండి.	**बीजप्रक्रिया**	बियाणे पेरण्यापूर्वी रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी बियाणे प्रक्रिया करा (उदा., कॅप्टन सारख्या योग्य रसायनाने @ २ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे).
Weed Management	Fertilizer / Nutrient Management: Basal dose per acre: Urea 90 kg, SSP 125 kg, MOP 35 kg (equivalent to N 40 kg, P 20 kg, K 20 kg). Application: At land preparation apply basal; at sowing apply one third of nitrogen + full P & K; remaining N at vine growth stage.	**పోషక నిర్వహణ**	ఎరువులు/పోషణ నిర్వహణ: ఎకరానికి బేసల్ మోతాదు: యూరియా 90 కి.గ్రా., సూపర్ ఫాస్ఫేట్ 125 కి.గ్రా., పొటాష్ 35 కి.గ్రా. (40 కి.గ్రా. నత్రజని, 20 కి.గ్రా. భాస్వరం 20 కి.గ్రా. పొటాషియం 20 కి.గ్రా. కి సమానం కి)। అప్లికేషన్: భూమి తయారీ సమయంలో బేసల్ మోతాదు వర్తించండి; నత్రజని మోతాదులో మూడవ వంతు + భాస్వరం మరియు పొటాషియం యొక్క పూర్తి మోతాదు, తీగ పెరుగుదల దశలో నత్రజని యొక్క మిగిలిన భాగం.	**खत व्यवस्थापन**	खत / पोषक तत्व व्यवस्थापन: प्रति एकर पायाभूत मात्रा: युरिया ९० किलो, एसएसपी १२५ किलो, एमओपी ३५ किलो (९० किलो नायट्रोजन, २० किलो फॉस्फरस, २० किलो पोटॅशियमच्या समतुल्य). लागू: जमीन तयार करताना पायाभूत मात्रा द्या; पेरणीच्या वेळी एक तृतीयांश नायट्रोजन + पूर्ण फॉस्फरस आणि पोटॅशियम द्या; उर्वरित नायट्रोजन वेलीच्या वाढीच्या टप्प्यात द्या.	**ఎరువు నిర్వహణ**	ఎరువులు / పోషణ నిర్వహణ: ఎకరానికి బేసల్ మోతాదు: యూరియా 90 కి.గ్రా., సూపర్ ఫాస్ఫేట్ 125 కి.గ్రా., పొటాష్ 35 కి.గ్రా. (40 కి.గ్రా. నత్రజని, 20 కి.గ్రా. భాస్వరం 20 కి.గ్రా. పొటాషియం 20 కి.గ్రా. కి సమానం కి)। అప్లికేషన్: భూమి తయారీ సమయంలో బేసల్ మోతాదు వర్తించండి; నత్రజని మోతాదులో మూడవ వంతు + భాస్వరం మరియు పొటాషియం యొక్క పూర్తి మోతాదు, తీగ పెరుగుదల దశలో నత్రజని యొక్క మిగిలిన భాగం.	**खत व्यवस्थापन**	खत / पोषक तत्व व्यवस्थापन: प्रति एकर पायाभूत मात्रा: युरिया ९० किलो, एसएसपी १२५ किलो, एमओपी ३५ किलो (९० किलो नायट्रोजन, २० किलो फॉस्फरस, २० किलो पोटॅशियमच्या समतुल्य). लागू: जमीन तयार करताना पायाभूत मात्रा द्या; पेरणीच्या वेळी एक तृतीयांश नायट्रोजन + पूर्ण फॉस्फरस आणि पोटॅशियम द्या; उर्वरित नायट्रोजन वेलीच्या वाढीच्या टप्प्यात द्या.
Fertiliser Management	Weed Control: Use manual hoeing and/or chemical control. Example: Glyphosate @ 1.6 litre per 150 litre water for non-crop weeds.	**పురుగు నియంత్రణ**	అవాంఛిత మొక్కల నియంత్రణ: కలుపు తీయడం మరియు/లేదా రసాయనిక నియంత్రణ ఉపయోగించండి. ఉదాహరణ: పంట లేని కలుపు మొక్కల కోసం 150 లీటర్ నీటికి 1.6 లీటర్ గ్లైఫోసేట్ @ 1.6 లీటర్ ఫలితం.	**खत व्यवस्थापन**	तण नियंत्रण: हाताने कुदारी आणि/किंवा रासायनिक नियंत्रणाचा वापर करा. उदाहरणार्थ: पिकाव्यतिरिक्त क्षेत्र तणनाशके १५० लिटर पाण्यात १.६ लीटर ग्लायफोसेट वापरा.	**ఎరువు నిర్వహణ**	ఎరువు నిర్వహణ: పెరిగే గుణించే ఎరువులను మరియు/లేదా రసాయనిక నియంత్రణను ఉపయోగించండి. ఉదాహరణ: ఒకటిన్నర లీటర్ నీటికి 150 లీటర్ నీటికి 1.6 లీటర్ గ్లైఫోసేట్.	**खत व्यवस्थापन**	खत व्यवस्थापन: तण नियंत्रण: हाताने कुदारी आणि/किंवा रासायनिक नियंत्रणाचा वापर करा. उदाहरणार्थ: पिकाव्यतिरिक्त क्षेत्र तणनाशके १५० लिटर पाण्यात १.६ लीटर ग्लायफोसेट वापरा.
Irrigation Management	Irrigation: Frequent irrigation is required in summer; approx. 10-12 irrigations during the crop cycle. First irrigation pre-sowing, then every 2-3 days initially, later every 4-5 days. Drip irrigation is advantageous. Apni Khati	**నీటి నిర్వహణ**	నీటిపారుదల: వరదల నీటిపారుదల ఇష్టపడతారు. పంట చక్రంలో 10-12 సార్లు నీటిపారుదల. మొదటి నీటిపారుదల విత్తనానికి ముందు. తరువాత 2-3 రోజులకు, తరువాత 4-5 రోజులకు. బిందు నీటిపారుదల ప్రయోజనకరమైనది. ఆప్నీ ఖేతీ	**सिंचन व्यवस्थापन**	सिंचाई: उन्हाळ्यात वारंवार सिंचाई घ्यावी लागते; पीक चक्रात अंदाजे १०-१२ सिंचाई. पहिली सिंचाई पेरणीपूर्वी, त्यानंतर सुरुवातीला दर २-३ दिवसांनी आणि नंतर दर ४-५ दिवसांनी. ठिबक सिंचन फायदेशीर ठरते. आपली शेती	**నీటిపారుదల నిర్వహణ**	నీటిపారుదల: వరదలతో నీటిపారుదల అవసరం; పంట చక్రంలో 10-12 నీటిపారుదల. మొదటి నీటిపారుదల విత్తనానికి ముందు. ఆ తర్వాత మొదట్లో ప్రతి 2-3 రోజులకు, తర్వాత ప్రతి 4-5 రోజులకు నీటిపారుదల చేయండి. బిందు నీటిపారుదల ప్రయోజనకరం. అప్నీ ఖేతీ	**सिंचन व्यवस्थापन**	सिंचाई: उन्हाळ्यात वारंवार सिंचाई घ्यावी लागते; पीक चक्रात अंदाजे १०-१२ सिंचाई. पहिली सिंचाई पेरणीपूर्वी, त्यानंतर सुरुवातीला दर २-३ दिवसांनी आणि नंतर दर ४-५ दिवसांनी. ठिबक सिंचन फायदेशीर ठरते. आपली शेती
Pest Management	Pest Management: Fruit flies, aphids common pests. Neem oil @3% commonly recommended; practice crop hygiene.	**తెగుళ్ల నియంత్రణ**	తెగుళ్ల నిర్వహణ: పండ్ల ఈగలు, అఫిడ్స్ సాధారణ తెగుళ్లు. వేప నూనె @3% సాధారణ సిఫార్సు; పంట పరిశుభ్రత పాటించండి.	**कीड व्यवस्थापन**	कीड व्यवस्थापन: फळमाशी, मावा हा सामान्य कीड आहेत. सामान्यपणे ३% कडुलिंबाच्या तेलाची शिफारस केली जाते; पिकाच्या स्वच्छतेचे पालन करा.	**కీటకాల నియంత్రణ**	కీటకాల నియంత్రణ: పండ్ల ఈగలు, అఫిడ్స్ ప్రధాన కీటకాలు. 3% వేప నూనె సాధారణంగా సిఫార్సు చేయబడింది; పంట పరిశుభ్రతను పాటించండి.	**कीड नियंत्रण**	कीड नियंत्रण: फळमाशी, मावा हे सामान्य कीटक आहेत. ३% कडुलिंब तेल सामान्यपणे शिफारस केले जाते; पीक स्वच्छतेचे पालन करा.
Disease Management	Disease Management: Powdery mildew managed with fungicidal sprays (azithrobatin etc.); mosaic and other foliar diseases controlled via appropriate sprays and sanitation.	**వ్యాధి నియంత్రణ**	వ్యాధి నిర్వహణ: బూజు తెగులు శిలీంధ్ర స్ప్రేలతో నిర్వహించబడుతుంది (అజిత్రోబాటిన్ మొదలైనవి); మొజాయిక్ మరియు ఇతర ఆకు వ్యాధులు తగిన స్ప్రేలు మరియు పారిశుద్ధ్యం ద్వారా నియంత్రించబడతాయి.	**रोग व्यवस्थापन**	रोग व्यवस्थापन: भुरी रोगाचे व्यवस्थापन बुरशीनाशक फवारणीद्वारे (अझिथ्रोबॅटिन इत्यादी) केले जाते; मोझेक आणि इतर पानावरील रोगांवर योग्य फवारणी आणि स्वच्छतेद्वारे नियंत्रण ठेवले जाते.	**వ్యాధి నియంత్రణ**	వ్యాధి నియంత్రణ: బూడిద తెగులు శిలీంధ్ర స్ప్రేలతో నిర్వహించబడుతుంది (అజిత్రోబాటిన్ మొదలైనవి); మొజాయిక్ మరియు ఇతర ఆకు వ్యాధులు తగిన స్ప్రేలు మరియు పారిశుద్ధ్యం ద్వారా నియంత్రించబడతాయి.	**रोग नियंत्रण**	रोग नियंत्रण: भुरी रोगाचे व्यवस्थापन बुरशीनाशक फवारणीद्वारे (अझिथ्रोबॅटिन इत्यादी) केले जाते; मोझेक आणि इतर पानावरील रोगांवर योग्य फवारणी आणि स्वच्छतेद्वारे नियंत्रण ठेवले जाते.
Harvesting / Yield	Harvesting / Yield: The crop starts yielding about 45-50 days after sowing. Apni Khati Typically 10-12 pickings are done. Yield: ~33-42 q/acre.	**కోత / దిగుబడి**	కోత / దిగుబడి: పంట విత్తిన దాదాపు 45-50 రోజుల పాటి 'పండ్ల ఉత్పత్తి' ప్రారంభమవుతుంది. ఆప్నీ ఖేతీ: సాధారణంగా 10-12 సార్లు కోతలు జరుగుతాయి. దిగుబడి: ~33-42 క్వింటాళ్లు/ఎకరం.	**कापणी / उत्पन्न**	कापणी / उत्पन्न: पेरणीनंतर सुमारे ४५-५० दिवसांनी पिकाचा उत्पन्न सिद्ध करणारे. आपली खेती: साधारणपणे १०-१२ वेळा तोडणी केली जाते. उत्पन्न: ~३३-४२ क्विंटल/एकर.	**పండ్ల ఉత్పత్తి**	పండ్ల ఉత్పత్తి: విత్తిన తరువాత 45-50 రోజుల తర్వాత పంట ఉత్పత్తి ప్రారంభమవుతుంది. ఆప్నీ ఖేతీ: సాధారణంగా 10-12 కోతలు జరుగుతాయి. దిగుబడి: ~33-42 క్వింటాళ్లు/ఎకరం.	**कापणी आणि उत्पन्न**	कापणी / उत्पन्न: पेरणीनंतर सुमारे ४५-५० दिवसांनी पिकाचा उत्पन्न सिद्ध करणारे. आपली खेती: साधारणपणे १०-१२ वेळा तोडणी केली जाते. उत्पन्न: ~३३-४२ क्विंटल/एकर.
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest & Handling: Harvest fruits when young & green, using sharp tool to avoid damage. Handle carefully, sort/grading for market. (Note: detailed post-harvest handling may need to be adapted locally.)	**కోత తర్వాత నిర్వహణ & నిల్వ**	కోత తర్వాత & నిర్వహణ: కోత తర్వాత పండ్లను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి, వాటిని పదునైన కత్తితో కత్తిరించండి మరియు మార్కెట్ కోసం క్రమబద్ధీకరించండి. (గమనిక: వివరణాత్మక కోత తర్వాత నిర్వహణ స్థానికంగా స్వీకరించాల్సి రావచ్చు.)	**अनुकूलन, साठवणूक**	कापणीनंतरची काळजी आणि हाताळणी: पंचे कोवळी आणि हिरवी असताना काढणीस, इजा टाळण्यासाठी धारदार अवजाराचा वापर करावा. काळजीपूर्वक हाताळणीत आणि बाजारासाठी त्यांची वर्गवारी/श्रेणीवर्गीकरण करावे. (टीप: कापणीनंतरच्या तपशिलवार हाताळणीचे स्थानिक पातळीवर बदल करावे लागतील आवश्यकता असू शकते.)	**అనుకూలత & నిల్వ**	అనుకూలత & నిల్వ: పండ్లను పదునైన కత్తితో కత్తిరించండి. పండ్లను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి మరియు మార్కెట్ కోసం క్రమబద్ధీకరించండి. (గమనిక: వివరణాత్మక కోత తర్వాత నిర్వహణ స్థానికంగా అనుకూలించాల్సి రావచ్చు.)	**अनुकूलन, साठवणूक**	अनुकूलन & साठवणूक: फळांना धारदार चाकूने कापा आणि काळजीपूर्वक हाताळा. बाजारासाठी वर्गीकरण करा. (टीप: कापणीनंतरच्या तपशीलवार हाताळणीला स्थानिक पातळीवर बदल करावे लागतील आवश्यकता असू शकते.)
Disclaimer	These recommendations are based on SAU's, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	**నిరాకరణ**	ఈ సిఫారసులు SAU, ప్రభుత్వ సంస్థలు మరియు ట్రయల్ సెంటర్ల ఆధారంగా ఉన్నాయి. వాస్తవ ఫలితాలు నేల రకం, వాతావరణం, రకం మరియు పంట నిర్వహణ పద్ధతులను బట్టి మారవచ్చు.	**अस्वीकरण**	या शिफारशींना SAU, सरकारी संस्था आणि चाचणी केंद्रांचा पाठिंबा आहे. प्रत्यक्ष परिणाम मातीचा प्रकार, हवामान, वाण आणि पीक व्यवस्थापन पद्धतींवर अवलंबून असू शकतात.	**అస్వీకరణ**	అస్వీకరణ: ఈ సిఫారసులు SAU/KVK, ప్రభుత్వ సంస్థలు మరియు ట్రయల్ సెంటర్ల ఆధారంగా ఉన్నాయి. వాస్తవ ఫలితాలు నేల రకం, వాతావరణం, రకం మరియు పంట నిర్వహణ పద్ధతులను బట్టి మారవచ్చు.	**अस्वीकृति**