PRACTICES	HYBRID CORIANDER (AROMA)	ગણકારવાલ	કુદરતી સંસાધન / કાચો માલ	વનસ્પતિ	ગુજરાતી	કુદરતી સંસાધન / કાચો માલ	हिन्दी	કાર્યવિધિઓ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ખેત જંતુ સ્વચ્છતા	જુનાથી જે પાકને વિચારી વાવણી કે કલમમાં, સમયસરમાં, જુનાથી કાંઈ રોગવાળાકાંઈનાના નીકળે એ દૂર કરો; શરૂ કરતાં જેથી કે ખાલ અને ઝાડ સાફ રાખે કે જેથી રોગ અને જંતુઓની વધારાની સંખ્યા ઘટે.	બીજાની સ્વચ્છતા	વાવણી પહેલાં પાકના અવશેષ અને નકામી વેલાં, નીંદણ, જૂનાં અને રોગગ્રસ્ત છોડના ભાગ દૂર કરો. ખેતરની કિનારીઓ સ્વચ્છ રાખો જેથી જંતુઓ અને રોગનું સંક્રમણ ઘટે.	खेत स्वच्छता	पिछली फसलों के अवशेष, खरपतवार, पुराने बेल और रोगग्रस्त/क्षतिग्रस्त पौधे बो देने से पहले हटा दें। खेत की मेड़ें साफ रखें ताकि कीट और रोगों का संक्रमण कम हो।	ખેત સ્વચ્છતા	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.5. Avoid waterlogging, heavy alkaline or saline soil.	મિશ્રણ જે કાલાવાલા	મધ્યમ કાંપવાળી રેતાળ માટી, સારા પણીવાળી, ફળદ્રુપ, સારા કાર્બનિક પદાર્થોવાળી. આદર્શ pH શ્રેણી: લગભગ 6.0-7.5. પાણી ભરાવાનું, ભારે આલ્કલાઇન અથવા ખારી માટી ટાળો.	માટીની આવશ્યકતા	ઝાડુવાળા નિકાસવાળી કે નિકાસવાળી કાંપવાળી; ઝાડમાં સિંચન કરવાની કુદરતી; સારા કાર્બનિક પદાર્થોવાળી. આદર્શ pH શ્રેણી: લગભગ 6.0-7.5. પાણી ભરાવાનું, ભારે આલ્કલાઇન અથવા ખારી માટી ટાળો.	मिट्टी की आवश्यकता	अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर। आदर्श pH सीमा: लगभग 6.0–7.5। जलभराव, भारी क्षारीय या लवणीय मिट्टी से बचें।	મિટ્ટી જરૂરિયાત	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	જુદા પરીક્ષણ	મિટ્ટી જે જરૂરવાળ, જોરાવ, અકાર્બિક પદાર્થો (કાર્બન); ઝીંક, લોહ, મૂલ્યવાન જોખમ કરતાં કે ઉંચા ઝાડ જે કાલ જુદા 2-3 કરતાં કે જેવા વાર વિગતે કાં નક્કીકામ અને ઝીંક નક્કીકામ પરીક્ષણની કે કરાવા પણ કરાવો.	માટી પરીક્ષણ	EC, pH, OC અને મેક્રો-માઇક્રો પોષક તત્વો માટે દર 2-3 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછું એક વાર માટી પરીક્ષણ કરો અને પરીક્ષણ પરિણામોને આધારે ખાતર નાખો.	मृदा परीक्षण	EC, pH, OC और मैक्रो-माइक्रो पोषक तत्वों के लिए हर 2-3 वर्ष में कम से कम एक बार मृदा परीक्षण करें और परीक्षण परिणामों के आधार पर उर्वरक लगाएँ।	માટી પરીક્ષણ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Climate Suitability	Climate Requirement Prefers cool, dry, frost-free climate. Optimum temperature: 20 – 25 °C. High temperatures during flowering reduce seed set; heavy rain at maturity reduces yield.	આબાણ સાનુકૂલતા	કલકાણ સંબંધી કલકાણવાળાં ઠંડી, શુષ્ક અને પાલે જે જુનાં કલકાણ પસંદ કરાતી છે! ફળદાન કલકાણ: 20-25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ફુલ કાલે કે દરમિયાન ઝાડ કલકાણ કે તીવ્ર વિલંબ કરતાં કાલ કે; વરસાદ કે કલકાણ માટે કાપિત કે કલકાણ કે કાલી છે!	વાતાવરણ યોગ્યતા	વધુ, ઓછો ઠંડુંવાળા કલકાણ પસંદ કરતાં. આદર્શ તાપમાન: ૨૦ – ૨૫°C. ફુલોની દરમિયાન ઊંચા તાપમાન બીજનો સેટ ઘટાડે છે; પરિપક્વતા સમયે ભારે વરસાદ ઉપજ ઘટાડે છે.	तापमान आवश्यकता ठंडा, सूखा, तुषार-मुक्त वातावरण पसंद करता है। इष्टतम तापमान: 20 – 25 °C. फूलने के दौरान उच्च तापमान बीज सेटिंग को कम करता है; परिपक्वता के समय भारी वर्षा उपज को कम करती है।	જલવાયુ યોગ્યતા	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Land preparation	Land Preparation 2–3 ploughings followed by harrowing to get fine tilth. Incorporate 5-6 t FYM/acre during final ploughing. Level field for uniform moisture and sowing depth.	ખેત તૈયારી	ઝીણી તૈયાર કરવા જુનાથી માટી અને વિંધેલાં માટી સાથે ખાતર ભેળવો. ખેતરને સમતલ કરો જેથી કે ભેજ અને બીજ વાવણી સમાન રહે.	જમીનની તૈયારી	2-3 ખેડાણ કર્યા પછી સારી માટી તૈયાર કરવા હેરો. અંતિમ ખેડાણ દરમિયાન પ્રતિ એકર 5-6 ટન ખાતર ભેળવો. ખેતરને સમતલ કરો જેથી ભેજ અને વાવણી ઊંડાઈ એકસમાન રહે.	खेत की तैयारी	2–3 जुताइयाँ, उसके बाद हेरावाला। अंतिम जुताई के दौरान प्रति एकड़ 5–6 टन गोबर खाद मिलाएँ। खेत को समतल करें ताकि नमी और बुवाई की गहराई एकसमान रहे।	ખેત તૈયારી	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Sowing Time	Sowing Time / Season • Rabi season: October – November (main season). • Kharif (limited): June – July (in southern India).	બુવાઈ નો સમય	વાવણી સમય / ઋતુ • રબી ઋતુ: ઓક્ટોબર – નવેમ્બર (મુખ્ય સીઝન). • ખરીફ (મર્યાદિત): જૂન – જુલાઈ (દક્ષિણ ભારત માં).	વાવેતરનો સમય	વાવણીની રીત / ઋતુ • રબી ઋતુ: ઓક્ટોબર – નવેમ્બર (મુખ્ય ઋતુ). • ખરીફ (મર્યાદિત): જૂન – જુલાઈ (દક્ષિણ ભારતમાં).	बुवाई का समय	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Seed rate & Spacing	Seed Rate / Sowing Method / Spacing Seed rate: 8 – 10 kg/acre for grain crop, 12 – 15 kg/acre for leafy crop. Sowing method: Broadcast or line sowing. For uniform stand, use split seeds (lightly crushed). Spacing: 30 cm × 10 cm (row × plants).	બીજ દર અને દૂરી	બીજ નો દર / વાવણી પદ્ધતિ / અંતર બીજ દર: અનાજના પાક માટે 8 – 10 કિલોગ્રામ; પાંદડાવાળા પાક માટે 12 – 15 કિલોગ્રામ. વાવણી પદ્ધતિ: છાંટો અથવા લાઇન વાવણી. એકસમાન અંકુર માટે, વિભાજિત બીજ (થોડા મુક્ત કરેલાં) નો ઉપયોગ કરો. અંતર: 30 સેમી × 10 સેમી (પંક્તિઓ × છોડ).	વિત્તેરે દર / વાવણી પદ્ધતિ / અંતર વિત્તેરે દર: ધાન્ય વિત્તેરાણી 8 – 10 કિલોગ્રામ; પાંદડાવાળા વિત્તેરાણી 12 – 15 કિલોગ્રામ. વાવેતરની પદ્ધતિ: વિક્ષેપ કિંવા પંક્તિમાં વાવેતર. સમાન વાવેતરમાં સહાય કરવા વિત્તેરાણી, ભાંગેલાં વિત્તેરાણી (હળવેક કુચલેલાં) વાપરો. અંતર: 30 સેમી × 10 સેમી (પંક્તિ × છોડ).	બીજ દર અને વાવણી અંતર	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Seed Treatment	Seed Treatment / Fungicide Treat seeds with Thiram or Captan @ 3 g/kg seed to control seed borne diseases. For bio-control: use Trichoderma viride @ 4 g/kg. For sub-prime areas: soak seeds in Carbendazim @ 1 g/l. for 30 min before drying.	બીજ ઉપચાર	બીજ ઉપચાર / ફાયટ્રલ્લાક બીજ કાર્બિત રોગો અને વિત્તેરિત્ય અટકે કે સિંચ તીકાં માં વિત્તેરાન દર કિલોગ્રામ દીઠ 3 ગ્રામ થીરમ કે કેપ્ટાન સાથે સારવાર કરો. જૈવિક નિયંત્રણ કે લિયે: ટ્રાઇકોડર્મા વિરિડિ કે કલકાણ દીઠ 4 ગ્રામ. ઓછાવાળી કે સંભાવના કાર્ય કાર્ય કે: બીજને બુડાડતાં કે પહેલાં 30 મિનિટ કે લિયે કાર્બેન્ડાઝિમ કે 1 ગ્રામ/લિટર માં ડૂબાડો.	બીજ સારવાર	બીજ કાર્બિત / ફુગનાશક વિત્તેરાણોદ્વારા વાવેલાં બીજ નિયંત્રણ કિલોગ્રામદાતી વિત્તેરિ કિંવા કેપ્ટાન 3 ગ્રામ/કિલોગ્રામ બીજ સાથે સારવાર કરો. જૈવિક નિયંત્રણમાટે: ટ્રાઇકોડર્મા વિરિડ્યુલાન 4 ગ્રામ/કિલો ની સારવાર કરવા માટે. ઓછા વિત્તેરાણ સંભાવનાવાળા વિસ્તારો માટે: બીજને સૂકવતાં પહેલાં 30 મિનિટ માટે કાર્બેન્ડાઝિમ @ 1 ગ્રામ/લિટર માં ડૂબાડો.	બીજ સારવાર	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Weed Management	Weed Control First weeding: 20 days after sowing, second = 35 days. Use pre-emergence Pendimethalin @ 1.5 liters/ha (potential) immediately after sowing in moist soil.	નકામાં નિંદામણ	નીંદણ નિયંત્રણ બુવાઈ કે અગાઉ 20 દિવસ બાદ પહેલી નિંદણી, અને અગાઉ 35 દિવસ બાદ બીજી નિંદણી. બુવાઈ કે તુરંત બાદ ભેજ ધરાવતી જમીન માં પેન્ડીમેથેલિન @ 1.5 લિટર/એકર (જો પરવાનગી હોય તો) લગાવો.	નીંદણ નિયંત્રણ	નીંદણ નિયંત્રણ પ્રથમ નિંદામણ: વાવણી પછી 20 દિવસ પછી, બીજું = 35 દિવસ પછી. વૈકલ્પિક પ્રતિબંધક: વાવણી પછી તરત જ ઘટ્ટ-ભેજવાળી જમીનમાં પેન્ડીમેથેલિન @ 1 લિટર/એકર (જો પરવાનગી હોય તો) લગાવો.	खरपतवार प्रबंधन	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Fertilizer Management	Fertilizer & Nutrient Management (Per Acre) Organic manure: 5 – 6 t FYM before sowing. Chemical fertilizers • Urea – 65 kg (= 30 kg N) • SSP – 125 kg (= 20 kg P2O5) • MOP – 30 kg (= 18 kg K2O) Apply full P & K and ½ N at basal; remaining ½ N at 30 days after sowing.	પ્રતિકાર સંબંધિત	પ્રતિકાર તથા પોષક તત્વ વ્યવસ્થા (પ્રતિ એકર) જૈવિક ખાતર: વાવણી પહેલાં 5-6 ટન સડેલું ખાતર. રાસાયણિક ખાતર: યુરિયા – 65 કિલો (= 18 કિલો નાઇટ્રોજન) SSP – 125 કિલો (= 20 કિલો ફોસ્ફરસ એન્હ) MOP – 30 કિલો (= 18 કિલો ફોસ્ફરસ એન્હ) વાવણી પહેલાં કે દિવસે પોટાશ અને પૂરી માત્રાનાં ફોસ્ફરસ આપો અને ½ નાઇટ્રોજન આપો; બાકી રહેલું ½ નાઇટ્રોજન વાવણી પછી 30 દિવસ પછી આપો.	ઉર્વરક પ્રબંધન	ઉર્વરક પ્રબંધન ઝાડ દીઠ જૈવિક ખાતર (સડેલાં છાણ): 5-6 ટન બુવાઈ પહેલાં. રાસાયણિક ખાતર: યુરિયા – 65 કિલો (= 30 કિલો નાઇટ્રોજન) SSP – 125 કિલો (= 20 કિલો ફોસ્ફરસ) MOP – 30 કિલો (= 18 કિલો પોટાશ) બુવાઈ પહેલાં પૂરા ફોસ્ફરસ અને પોટાશ અને અડધા નાઇટ્રોજન આપો; બાકી નાઇટ્રોજન વાવણી પછી 30 દિવસ પછી આપો.	ઉર્વરક પ્રબંધન	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Irrigation Management	Irrigation Management First irrigation immediately after sowing, second after 7-10 days. Then irrigate every 12–15 days depending on soil and season. Avoid overwatering, moisture stress at flowering lowers yield.	સિંચાઈ વ્યવસ્થા	સિંચાઈ વ્યવસ્થા બુવાઈ કે તુરંત બાદ પહેલી સિંચાઈ; 7-10 દિવસ પછી બુવાઈ સિંચાઈ; ત્યારે બાદ દર 12-15 દિવસે જમીન અને સીઝન ના આધાર પર 12-15 દિવસે જમીન સિંચાઈ કરો. ઝાડિયા પછી ફૂલ ની વખત જરૂર કરતાં વધારે પાણી ન આપો અને ભેજ ની અછત ના કારણે ઉપજ ઘટાડે છે.	સિંચાઈ વ્યવસ્થા	સિંચાઈ વ્યવસ્થા વાવેતર પછી તરત જ પહેલું સિંચાઈ; 7-10 દિવસ પછી બીજું સિંચાઈ. પછી જમીન અને ઋતુના આધારે દર 12-15 દિવસે સિંચાઈ કરો. ઝાડ પાડ્યા પછી અને ફૂલ વખતે દર 12-15 દિવસે સિંચાઈ કરવા. ઓછું પાણી આપવું અને ભેજનું તણાવ ઉપજ ઘટાડે છે.	सिंचाई प्रबंधन	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Pest Management	Pest Management 1. Aphids: Contact dusting/Systemic spray Dimethoate 30 EC @ 300 ml/acre in 200 L water. 2. Cutworm / Armyworm: Dust Carbaryl 5% @ 10 kg/acre or use light traps. 3. Leaf miner: Spray Spinosad @ 0.3 ml/L.	કીટ પ્રબંધન	કીટ પ્રબંધન 1. જીવાંકણ: મુખ્ય કાલે કે દરેકર કાલ કાંઈ પર પાક કાલે છે. સાઇનોમેલન અ વિકલ્પ 100 મિલીલીટર પ્રતિ એકર અને ઝેર 2% કીટ દર કે સાથે. 2. અળસિયાં/સૈનિકો: કાર્બેરિલ 5% ધૂળ વિકલ્પ 10 કિ. પ્રતિ એકર કીટ દર કે સાથે પ્રકાશ ફાંદો પ્રયોગ કરો. 3. ઝીંક ભમરાં: સ્પિનોસાડ @ 0.3 મિલીલીટર લગાવ કરો.	પ્રબંધન	પ્રબંધન 1. ચેપી જંતુઓ: ડાયમેથોએટ 30 ઇસી @ 300 મિલી/એકર 200 લિટરમાં પાણી. 2. કટવર્મ / આર્મીવર્મ: કાર્બેરિલ 5% ધૂળ 10 કિલોગ્રામ/એકર અથવા પ્રકાશ ફાંદાનો ઉપયોગ કરો. 3. પાંદડા ખાનાર: સ્પિનોસાડ 0.3 મિલી/લિટર પર છંટકાવ કરો.	प्रबंधन	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Disease Management	Disease Management 1. Powdery Mildew: Spray Wettable Sulphur @ 20 g/10 L. Repeat after 15 days if needed. 2. Stem Gall: Avoid continuous coriander cropping; destroy infected plants. 3. Wilt / Root Rot: Treat seeds and soil with Trichoderma viride @ 4 kg/acre + FYM 50 kg before sowing; drench with Carbendazim @ 1 g/L.	રોગ પ્રબંધન	રોગ પ્રબંધન 1. પાવડરી મિલ્ડ્યુ: વેટેબલ સલ્ફર @ 20 ગ્રામ/10 લીટર ના મિશ્રણ નો છંટકાવ કરો. 15 દિવસ પછી ફરી છંટકાવ કરવા કરો. 2. સ્ટેમ ગોલ: સતત ધાણાનું વાવેતર ટાળો અને સંક્રમિત છોડ નો નાશ કરો. 3. મૂરઝાવું અને મૂળનો સડો: વાવણી પહેલાં બીજ અને ખાતરને ટ્રાઈકોડર્મા વિરિડિ @ 4 કિ.ગ્રા./એકર + 50 કિ.ગ્રા. ખાતર ના મિશ્રણ થી સારવાર કરો; કાર્બેન્ડાઝિમ @ 1 ગ્રામ/લિટર નો ડ્રેન્ચ કરો.	રોગ પ્રબંધન	રોગ પ્રબંધન 1. ચૂર્ણી ફૂગ: વેટેબલ સલ્ફર (ઉત્પાદન સિંચાઇમાં ઉમેરી શકાય) @ 20 ગ્રામ/10 લિટર પાણી દીઠ છંટકાવ કરો. 15 દિવસ પછી ફરી છંટકાવ કરવા. 2. સ્ટેમ ગોલ: સતત ધાણાની વાવણી ટાળો; રોગગ્રસ્ત છોડને નષ્ટ કરો. 3. મૂરઝાવું અને મૂળનો સડો: વાવણી પહેલાં બીજ અને ખાતરને ટ્રાઈકોડર્મા વિરિડિ @ 4 કિલોગ્રામ + 50 કિલોગ્રામ ખાતર સાથે સારવાર કરો; કાર્બેન્ડાઝિમ @ 1 ગ્રામ/લિટર સાથે ડ્રેન્ચ કરો.	रोग प्रबंधन	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Harvesting & Yield	Harvesting / Yield For green leaves: Harvest 30–40 days after sowing, when plants are 15–20 cm tall. Cut at ground level, when most seeds turn brown. Cut, dry and thresh. Average yield: 9–10 q/acre (grain) or 80–100 q/acre (green leaves).	બુવાઈ કરો કાપવા	બુવાઈ / ઉપજ લીલાં પાંદડાં માટે: વાવણી પછી 30-40 દિવસ પછી કાપણી કરો. દાણા માટે: વાવણી પછી 90-110 દિવસ પછી કાપણી કરો, જ્યારે મોટાભાગના બીજ ભૂરા થઈ જાય. કાપો, સૂકવો અને ઝૂડો કરો. સરેરાશ ઉપજ: 8-10 ક્વિન્ટલ/એકર (અનાજ) અથવા 80-100 ક્વિન્ટલ/એકર (લીલાં પાંદડાં).	બુવાઈ કાપણી ઉપજ	બુવાઈ / ઉપજ ઉપયોગ અનુસાર કાપણી: પાંદડાંઓ 30 – 40 દિવસથી બુવાઈ. બિયાંનાંઓ: પાંદડાંઓ 90 – 110 દિવસથી, ત્યારે બહુમાં બિયાં ભૂરાં થઈ જાય ત્યારે કાપણી કરો. સરેરાશ ઉપજ: 8 – 10 ક્વિન્ટલ/એકર (અનાજ) કિંવા 80 – 100 ક્વિન્ટલ/એકર (લીલાં પાંદડાંઓ).	કાપણી ઉપજ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Post-Harvest Management & Storage	Post-Harvest Handling Dry harvested seeds in shade until moisture < 10%. Clean and grade before packing. Store in airtight grade polypropylene bags in dry conditions. For leaves: bunch and market immediately after harvest.	બુવાઈ કાપણી પછી સંગ્રહ અને સંગ્રહ	બુવાઈ પછીનું સંચાલન અને સંગ્રહ	બુવાઈ પછીનું સંચાલન	બુવાઈ પછીનું સંચાલન અને સંગ્રહ બુવાઈ કરેલાં બીજ ભેજ 10% કરતાં ઓછા થાય ત્યાં સુધી છાંયડામાં સૂકવો. પેક કરતાં પહેલાં ગ્રેડ કરો અને ચાળો. સૂકા વાતાવરણમાં કન્ટ્રોલ્ડ ઓક્સિજનવાળી કોથળીઓમાં સંગ્રહ કરો. પાંદડાંઓ માટે: કાપણી પછી તરત જ ગુચ્છો બાંધો અને બજારમાં મોકલો.	બુવાઈ પછીનું સંચાલન અને સંગ્રહ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)
Disclaimer	These recommendations are based on SAU's, government agencies, and trial centers. Actual results may vary depending on soil type, climate, variety, and crop management practices.	અસ્વીકાર	આ ભલામણો SAU, સરકારી એજન્સીઓ અને ટ્રાયલ સેન્ટરો પર આધારિત છે. વાસ્તવિક પરિણામો જમીનનો પ્રકાર, હવામાન, વિવિધતા અને પાક વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓ પર આધાર રાખીને બદલાઈ શકે છે.	અસ્વીકાર	આ ભલામણો સરકારી સંસ્થાઓ અને પ્રાયોગિક કેન્દ્રોના અભ્યાસ પર આધારિત છે. વાસ્તવિક પરિણામો જમીનનો પ્રકાર, હવામાન, વિવિધતા અને પાક વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓ પર આધાર રાખીને બદલાઈ શકે છે.	अस्वीकरण	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)	ગણકારવાલ	ગુજરાતી	ગણકારવાલ ઉત્પાદકતાની (મૂલ્યવાનની)